



Центральный офис АО «ФМРУС»

127273, г. Москва,
ул. Отрадная, 2Б, с. 1, эт. 8
8 (495) 741 27 35

www.fmrus.ru

Региональные филиалы:

г. Барнаул 8 (963) 526 60 04
г. Белгород 8 (919) 280 06 19
г. Благовещенск 8 (924) 444 05 11
г. Волгоград 8 (918) 637 03 08
г. Воронеж 8 (903) 420 37 80
г. Казань 8 (917) 890 03 73
г. Краснодар 8 (918) 018 12 96
г. Курск 8 (910) 270 02 59
г. Липецк 8 (903) 863 10 55,
8 (910) 286 66 68
г. Новосибирск 8 (964) 084 47 25

г. Нарткала 8 (960) 428 49 47
г. Оренбург 8 (961) 929 49 16
г. Орёл 8 (910) 270 02 59
г. Пенза 8 (980) 670 48 93
г. Ростов 8 (918) 637 03 08
г. Самара 8 (917) 124 71 34
г. Саратов 8 (915) 871 15 09
г. Ставрополь 8 (928) 321 98 32
г. Тамбов 8 (915) 880 05 36
г. Уссурийск 8 (984) 140 04 33
Респ. Крым 8 (918) 240 16 40



КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2023



О компании

АО «ФМРус» основано в сентябре 1999 года как эксклюзивный дистрибьютор международного концерна на территории РФ. На протяжении шести лет представители компании активно продвигали технологии концерна, делая акцент на реализации продуктов из групп гербицидов и инсектицидов.

Начиная с 2003 года АО «ФМРус» развивается как самостоятельное предприятие с собственным производством и зарегистрированными товарными знаками.

С ростом объемов реализации и в соответствии с требованиями рынка в 2003 году приобретена производственная площадка в г. Новомосковск (Тульская область). На старте производства введены в строй линии текучих паст (ТПС) и водных эмульсий (ВЭ). Первыми продуктами, выпущенными на производственных линиях завода, стали фунгицидный протравитель Тир, ТПС и инсектицид Таран, ВЭ.

Сегодня ежегодный объем производства составляет более 7000 тонн готовой продукции.

Ассортимент производимых пестицидов и агрохимикатов постоянно расширяется и позволяет предлагать аграриям комплексные программы защиты основных полевых культур. Создавая продуктовый портфель, ФМРус стремится достичь оптимального соотношения эффективности, технологичности и экологичности его компонентов.

Компания является лидером в производстве продуктов для защиты сои, от протравливания семян до десикации посевов.

АО «ФМРус» является членом «Российского союза производителей химических средств защиты» и принимает активное участие в развитии пестицидного рынка.

Компания тесно сотрудничает с ИЦ «Сколково», ВИЗР, ВНИИФ, ФНЦГ им. Эрисмана, ФНЦО, РГАУ МСХА им. К.А. Тимирязева и другими научными учреждениями, что позволяет вести исследовательские работы по селекции полевых культур, токсикологии и биологической активности пестицидов, разрабатывать и регистрировать новые продукты.

Приоритетное значение компания отводит контролю качества готовой продукции на каждом этапе производства и оценке ее эффективности в производственных испытаниях.

Одним из направлений деятельности «ФМРус» является реализация собственной технологии дражирования семян сельскохозяйственных культур, в том числе рапса и сахарной свеклы.

Развитая сеть региональных представительств и складов делает путь от заказа до поступления товаров предельно коротким, а профессиональная команда агрономов помогает принимать правильные решения для достижения максимального результата.

Оглавление

О компании	1	Профикс, КЭ	42	Аргамак, ВДГ	86	Тифи, ВДГ	126
Комплексные схемы защиты	5	Тебумет, КЭ ^{НОВИНКА}	44	Астэрикс, СЭ	88	Флуорон, ВДГ	128
Зерновые	6	ТриЗаРа Супер, КЭ ^{НОВИНКА}	46	Ацифект, ВК	90	Фомесофт, ВК	130
Кукуруза	8	Фолиант, КЭ ^{НОВИНКА}	48	Бентасил, ВР	92	Формуляр, КЭ ^{НОВИНКА}	132
Соя	10	Экселент, КС	50	Буцефал, КЭ	94	Эндимион, КЭ	134
Сахарная свекла	12	Инсектициды	53	Вымпел 2, КЭ	96	Десиканты	137
Рапс	14	Айвенго, КЭ	54	Вымпел 3, КЭ	98	Буцефал, КЭ	138
Подсолнечник	16	Клипер, КЭ	56	Галлон, КЭ	100	Молоток, ВР	140
Инсектицидные протравители ..	19	Клонрин, КЭ	58	Гримс, ВДГ	102	ПАВы и удобрения	143
Вулкан, ТПС	20	Метомакс, КС	62	Диамисоль, ВР	106	Ерёма, Ж	144
Имидалит, ТПС	22	Прокроп, КЭ	64	Дикамерон, ВР	108	Агент С, Ж	146
Тиамакс, КС	24	Таран, ВЭ	68	Дифилайн, КЭ	110	Авилор АВИА, КЭ	148
Фунгицидные протравители	27	Тиамакс, КС	70	Зонатор, ВР	112	Альф, Ж	149
Тир, ТПС	28	Циперус, КЭ	72	Кайман, ВР	114	Бифактор, КЭ	150
ТМТД, ТПС	30	Гербициды	75	Кайман Форте, ВДГ	116	Кондиционер ФМР 20	151
Стингер, КС	32	Аврорекс, КЭ	76	Клорит, ВР	118	Спектр действия гербицидов ...	152
Стингер Трио, КС	34	Аврора, МД ^{НОВИНКА}	78	Клетодим		Условия хранения и фасовка ...	156
Экселент, КС	36	Акзифор, КЭ	80	Плюс Микс, КЭ ^{НОВИНКА}	120		
Фунгициды	39	Алгоритм, КЭ	82	Ларт, ВР	122		
Альпари, КЭ	40	Антарес, ВК	84	Метарон, ВДГ	124		

Комплексные схемы защиты

Зерновые.....	6
Кукуруза.....	8
Соя	10
Сахарная свекла	12
Рапс	14
Подсолнечник	16



Схема защиты кукурузы



Стадия развития (код ВВСН)	0	0-9	12	13	15	
Спектр действия	семена	посев	всходы	2-й лист	3-5-й лист	6-й лист
Проволочники	Вулкан, ТПС					
Однолетние и многолетние злаковые и двудольные сорняки	Дифлайн, КЭ			Аврора, МД Гримс, ВДГ		
Однолетние двудольные, в т.ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х (подмаренник цепкий, вьюнок полевой и др.) и некоторые многолетние двудольные корнеотпрысковые сорняки				Аврорекс, КЭ Астэрикс, СЭ		
Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука				Клорит, ВР		
Хлопковая совка, кукурузный мотылек				Метомакс, КС		
Вредители запасов						Прокроп, КЭ



17-68	69	79	89	
вегетативная стадия развития	цветение	налив-молочная спелость	полная спелость	хранение
Циперус, КЭ				
				Прокроп, КЭ

Схема защиты сои

Стадия развития (код ВВСН)	00	05	10	13		
Спектр действия	до посева	посев	набухание семян	всходы	появление 2-3 тройчатого листа	ветвление
Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание	Экселент, КС					
Однолетние двудольные и некоторые злаковые	Алгоритм, КЭ Дифилайн, КЭ			Алгоритм, КЭ Зонатор, ВР Тифи, ВДГ		
				Ацифект, ВК Бентасил, ВР Фомесофт, ВК		
Однолетние и многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий				Галлон, КЭ Клетодим Плюс Микс, КЭ		
Бобовая огневка, гороховая плодожорка, тли, акациевая огневка, луговой мотылек, паутинный клещ				Клонрин, КЭ Метомакс, КС		
Переноспороз, септориоз, церкоспороз, аскохитоз, все виды ржавчин и пятнистостей				ТриЗаРа Супер, КЭ Экселент, КС		
Десикация						Молоток, ВР
Вредители запасов						Прокроп, КЭ

Стадия развития (код ВВСН)	51-79	89				
Спектр действия	бутонизация	цветение	образование бобов	налив семян	созревание плодов и семян	хранение
Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание						
Однолетние двудольные и некоторые злаковые						
Однолетние и многолетние злаковые, в т.ч. пырей ползучий						
Бобовая огневка, гороховая плодожорка, тли, акациевая огневка, луговой мотылек, паутинный клещ			Клонрин, КЭ Метомакс, КС			
Переноспороз, септориоз, церкоспороз, аскохитоз, все виды ржавчин и пятнистостей			ТриЗаРа Супер, КЭ Экселент, КС			
Десикация						Молоток, ВР
Вредители запасов						Прокроп, КЭ

Схема защиты сахарной свеклы

Стадия развития (код BBCH)	00	09	10	12	14	
Спектр действия	до посева	посев	всходы	семядоли	2 настоящих листа	4 настоящих листа
Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Алгоритм, КЭ Дифлайн, КЭ					
Однолетние двудольные сорняки, в т. ч. виды щирицы, однолетние злаковые сорняки					Вымпел 2, КЭ Вымпел 3, КЭ	
Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды ромашки, горца, бодяка и осота					Клорит, ВР	
Однолетние двудольные сорняки, в т. ч. щирица, марь белая					Метарон, ВДГ Флуорон, ВДГ	
Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т.ч. просо куриное, сорго полевое, виды щетинника, пырей ползучий					Галлон, КЭ Клетодим Плюс Микс, КЭ	
Комплекс вредителей		Айвенго, КЭ Клонрин, КЭ				
Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса						

Стадия развития (код BBCH)	16	18	35	49	
Спектр действия	6 настоящих листьев	8 настоящих листьев	50 % смыкания рядков	за 2-4 недели до уборки	хранение
Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Алгоритм, КЭ Дифлайн, КЭ				
Однолетние двудольные сорняки, в т. ч. виды щирицы, однолетние злаковые сорняки	Вымпел 2, КЭ Вымпел 3, КЭ				
Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т.ч. виды ромашки, горца, бодяка и осота	Клорит, ВР				
Однолетние двудольные сорняки, в т. ч. щирица, марь белая	Метарон, ВДГ Флуорон, ВДГ				
Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т.ч. просо куриное, сорго полевое, виды щетинника, пырей ползучий	Галлон, КЭ Клетодим Плюс Микс, КЭ				
Комплекс вредителей	Айвенго, КЭ Клонрин, КЭ				
Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса	Альпари, КЭ ТриЗаРа Супер, КЭ				Фолиант, КЭ

Схема защиты рапса

Стадия развития (код ВВСН)	00	07	19	21	
Спектр действия	до посева	посев	всходы	3-4 настоящих листа	формирование розетки
Крестоцветные блошки, проволочники, ложнопроволочники	Имидалит, ТПС Тиамакс, КС				
Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Алгоритм, КЭ Дифилайн, КЭ		Зонатор, ВР (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам) Галлон, КЭ Клетодим Плюс Микс, КЭ		
Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т. ч. просто куриное, сорго полевое, виды щетинника, пырей ползучий					
Однолетние и многолетние двудольные сорняки, в т. ч. виды ромашки, горца, бодяка и осота			Клорит, ВР Дикамерон, ВР		
Крестоцветные блошки, клопы, тли, белянки			Циперус, КЭ		
Капустная моль			Клипер, КЭ		
Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки					
Фомоз, альтернариоз, регуляция роста			ТебуМет, КЭ		
Фомоз, альтернариоз					
Повышение масличности					
Десикация					
Вредители запасов					

31-39	50-53	61-63	64	87	
формирование стебля	бутонизация	цветение	образование стручков	созревание плодов и семян	хранение
		Айвенго, КЭ Клонрин, КЭ Таран, ВЭ Тиамакс, КС			
ТебуМет, КЭ					
Ерёма, Ж					
				Клей Бифактор + Буцефал, КЭ	
				Прокроп, КЭ	

Схема защиты подсолнечника




Стадия развития (код ВВСН)	00	10	12-53	57	
	семена	за 2 недели до посева	посев-прораствание	всходы	развитие листьев
Проволочники	Вулкан, ТПС				
Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Дифилайн, КЭ				
Однолетние двудольные сорняки		Акцифор, КЭ		Зонатор, ВР (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам) Аргамак, ВДГ (сорта и гибриды Express)	
Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т. ч. просо куриное, сорго полевое, виды щетинника, пырей ползучий				Галлон, КЭ Клетодим Плюс Микс, КЭ	
Фомопсис, фомоз, серая гниль, белая гниль, альтернариоз				ТриЗаРа Супер, КЭ	
Хлопковая совка и др. листогрызущие вредители				Метомакс, КС	
Десикация					
Вредители запасов					



59-88	89	89	92	
бутонизация	формирование корзинок	начало побурения корзинок	спелость	хранение
			Буцефал, КЭ Молоток, ВР	
				Прокроп, КЭ

Инсектицидные протравители семян

Вулкан, ТПС.....	20
Имидалит, ТПС.....	22
Тиамакс, КС.....	24



Вулкан, ТПС

200 г/л бифентрина

- Обладает контактным и кишечным действием
- Защищает проросток, всходы и корневую систему растений
- Обеспечивает получение дружных всходов
- Обладает репеллентными свойствами для птиц
- Совместим с фунгицидными протравителями

Базовый инсектицидный протравитель семян для защиты подсолнечника и кукурузы от почвообитающих вредителей



Канистра 1 л и 5 л



Срок годности 3 года
от -5 до +40 °С

Механизм действия

Бифентрин является контактно-кишечным инсектицидом. Воздействует на нервную систему насекомого на уровне ацетилхолинового рецептора, вызывая перевозбуждение с последующим параличом и гибелью.

Спектр действия

Проволочники, ложнопроволочники, личинки майского хруща, личинки озимой совки и др.

Период защитного действия

Бифентрин имеет очень низкую растворимость в воде, поэтому он медленно разлагается и образует защитную капсулу около семени. Благодаря этому Бифентрин обеспечивает эффективную защиту семян, проростков и молодых растений от почвенных вредителей.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения резистентности обработки препаратом следует чередовать с препаратами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Обработку семян Вулканом проводят на протравочных машинах непосредственно перед посевом или заблаговременно (до 6 месяцев). Чтобы обеспечить высокое качество протравливания, необходимо выполнять следующие условия:

- семена должны быть без повреждений, очищены от пыли и примесей
- необходимо регулярно контролировать равномерность покрытия семян по степени окрашивания и норме расхода препарата.

Приготовление рабочей жидкости

- наполните бак протравочной машины на 1/2 необходимого объема воды и включите перемешивающее устройство
- встряхните канистру с препаратом
- добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата Вулкан и другие компоненты баковой смеси (предварительно проверенные на совместимость)
- добавьте оставшееся количество воды; перемешивание должно происходить в течение всего периода приготовления рабочей жидкости и процесса протравливания
- рабочий раствор необходимо использовать в течение первых суток после приготовления.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/т	Вредный объект	Способ применения
Подсолнечник	2	Проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян. Расход рабочей жидкости – до 12 л/т.
Кукуруза	2 - 2,5		Обработка семян за 14 и более дней до посева. Расход рабочей жидкости – до 12,5 л/т.

Имидалит, ТПС

500 г/л имидаклоприда + 50 г/л бифентрина

- Эффективен против почвообитающих и всходовых вредителей
- Обладает высокой скоростью воздействия на вредный объект
- Надежно защищает проросток и всходы до 45 дней с момента высева семян в почву
- Обеспечивает появление дружных всходов культур
- Совместим с фунгицидными протравителями

Универсальный инсектицидный протравитель семян контактно-системного действия



Канистра 5 л



Срок годности 2 года
от -5 до +35 °С

Механизм действия

Имидаклоприд относится к классу неоникотиноиды, бифентрин — к классу пиретроидов. Имидаклоприд обладает системными свойствами с острым контактно-кишечным эффектом. Бифентрин обладает контактно-кишечными свойствами. Оба действующих вещества блокируют процесс передачи нервного импульса, вызывая гибель насекомого вследствие сильного перевозбуждения и паралича.

Спектр действия

Проволочники, ложнопроволочники, крестоцветные блошки, злаковые мухи, хлебная жужелица, хлебные блошки, колорадский жук, тли.

Период защитного действия

Имидалит обеспечивает надёжную защиту семян и всходов культур до 45 дней с момента посева.

Возможность возникновения резистентности

Возникновение устойчивости маловероятно.

Рекомендации по применению

Обработку семян Имидалитом проводят на протравочных машинах перед посевом или заблаговременно (до 12 месяцев). При протравливании свежесобранных семян озимых с повышенной влажностью норму расхода рабочего раствора необходимо снизить. Чтобы обеспечить высокое качество протравливания, необходимо выполнять следующие условия:

- семена должны быть без повреждений, очищены от пыли и примесей
- необходимо регулярно контролировать равномерность покрытия семян по степени окрашивания и норме расхода препарата.

Приготовление рабочей жидкости:

- наполните бак протравочной машины на 1/2 необходимого объёма воды и включите перемешивающее устройство
- встряхните канистру с препаратом

- добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата и, при необходимости, другие компоненты баковой смеси (проверенные на совместимость)
- добавьте оставшееся количество воды; перемешивание должно происходить в течение всего периода приготовления рабочей жидкости и процесса протравливания
- рабочий раствор необходимо использовать в первые сутки после приготовления.

Совместимость

Совместим с фунгицидными протравителями и микроудобрениями, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/т	Вредный объект	Способ применения
Рапс	6 - 8	Крестоцветные блошки	Обработка семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости до 18 л/т.
Капуста		Крестоцветные блошки, весенняя капустная муха	
Пшеница	0,5	Хлебная жужелица	Обработка семян. Расход рабочей жидкости – до 10 л/т.
	0,4 - 0,5	Злаковые мухи, проволочники, хлебные блошки	
Ячмень яровой		Хлебные блошки, злаковые мухи	
Картофель	0,1 - 0,2	Проволочники, колорадский жук, тли	Расход рабочей жидкости – до 10 л/т клубней (перед посадкой), до 25 л/т клубней (при посадке).

Тиамакс, КС

240 г/л тиаметоксама

- Инсектицидный протравитель широкого спектра действия
- Продолжительная защита от комплекса вредителей всходов
- Контролирует как почвообитающих, так и наземных вредителей
- Совместим с фунгицидными протравителями
- Обеспечивает дружные всходы

Универсальный инсектицидный протравитель семян контактно-системного действия



Канистра 5 л



Срок годности 2 года от -5 до +35 °C

Механизм действия

Тиаметоксам поглощается растением в момент прорастания семян и передвигается по ксилеме к вегетативным частям растений. По механизму действия относится к ингибиторам ацетилхолинэстеразы, вызывает открытие натриевых каналов в цепочке передачи нервного импульса, что приводит к остановке питания и гибели насекомого вследствие перевозбуждения и паралича.

Спектр действия

Эффективен в борьбе с хлебной жучелицей, злаковыми мухами, хлебными блошками на зерновых и с крестоцветными блошками, проволочниками, ложнопроволочниками — на рапсе.

Скорость действия

Тиамакс начинает действовать с момента набухания-прорастания семян.

Период защитного действия

Период защитного действия до 40 дней, в зависимости от вредителя, обрабатываемой культуры и погодных условий в момент прорастания семян.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с инсектицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Обработку семян Тиамаксом проводят на протравочных машинах перед посевом или заблаговременно. При протравливании свежубранных семян озимых с повышенной влажностью норму расхода рабочего раствора необходимо снизить.

Чтобы обеспечить высокое качество протравливания, необходимо выполнять следующие условия:

- семена должны быть без повреждений, очищены от пыли и примесей
- необходимо регулярно контролировать равномерность покрытия семян по степени окрашивания и норме расхода препарата.

Приготовление рабочей жидкости:

- наполните бак протравочной машины на 1/2 необходимого объёма воды и включите перемешивающее устройство
- встряхните канистру с препаратом
- добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата Тиамакс и другие компоненты баковой смеси
- добавьте оставшееся количество воды; перемешивание должно происходить в течение всего периода приготовления рабочей жидкости и процесса протравливания

Рабочий раствор необходимо использовать в течение первых суток после приготовления.

Обработка семенных клубней картофеля

Для обработки клубней при посадке используют серийно выпускаемые картофелепосадочные машины, оснащённые аппликаторами для протравливания.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/т	Вредный объект	Способ применения
Пшеница, ячмень	0,7 - 1,4	Хлебная жучелица, внутривеблевые мухи, блошки	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 10 л/т.
Рапс яровой	12 - 15	Крестоцветные блошки, проволочники и ложнопроволочники	Обработка семян непосредственно перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости 20 л/т.
Картофель	0,3 - 0,4	Колорадский жук, проволочники и ложнопроволочники	Обработка клубней. Расход рабочей жидкости 10 л/т.

Фунгицидные протравители семян

Тир, ТПС.....	28
ТМТД, ТПС.....	30
Стингер, КС.....	32
Стингер Трио, КС.....	34
Экселент, КС.....	36



Тир, ТПС

400 г/л тирама + 25 г/л тебуконазола

- Обладает лечебным действием
- Обладает репеллентным действием на птиц и грызунов
- Подавляет развитие фузариозных и гельминтоспориозных корневых гнилей и головни

Универсальный протравитель семян
контактно-системного действия



Канистра 10 л



Срок годности 2 года
от 0 до +30 °С

Механизм действия

Тирам обладает контактным действием и ингибирует синтез белков в клетках грибов, останавливая процесс прорастания спор и начальный рост мицелия. Концентрируется в прикорневой зоне, обеспечивая надежную защиту от корневых гнилей и снежной плесени. Тебуконазол обладает системным действием и подавляет образование клеточных мембран. Обладает способностью передвигаться по развивающемуся растению, защищая надземную часть.

Спектр действия

Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян, пыльная головня, септориоз, каменная головня, ложная пыльная головня, сетчатая пятнистость, стеблевая головня, фузариозная снежная плесень.

Период защитного действия

Тир обеспечивает эффективную защиту семян, проростков и молодых растений от корневых гнилей и аэрогенных инфекций до фазы кущения.

Возможность возникновения резистентности

Благодаря содержанию двух действующих веществ с разным механизмом действия развитие резистентности маловероятно.

Рекомендации по применению

Обработку семян протравителем Тир проводят на протравочных машинах перед посевом или заблаговременно (до 6 месяцев). Расход рабочей жидкости составляет 10 л/т. При протравливании свежесобраных семян озимых с повышенной влажностью норму расхода рабочего раствора необходимо снизить.

Чтобы обеспечить высокое качество протравливания, необходимо выполнять следующие условия:

- семена должны быть без повреждений, очищены от пыли и примесей
- необходимо регулярно контролировать равномерность покрытия семян по степени окрашивания и норме расхода препарата.

Совместимость

Совместим с другими протравителями и микроудобрениями, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/т	Вредный объект	Способ применения
Пшеница яровая и озимая	1 - 1,2	Твердая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян за 7-14 дней до посева. Расход рабочей жидкости - 10 л/т.
	1,2	Пыльная головня, септориоз	
Ячмень яровой и озимый	1 - 1,2	Каменная головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	
	1,2	Пыльная головня, ложная пыльная головня, сетчатая пятнистость	
Рожь озимая	1 - 1,2	Стеблевая головня, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	
	1,2	Фузариозная снежная плесень (при слабом и умеренном развитии болезни)	

ТМТД, ТПС

400 г/л тирама

- Подавляет возбудителей корневых и прикорневых гнилей различной этиологии
- Обладает бактерицидным действием
- Подавляет семенную и почвенную инфекцию
- Совместим с инсектицидными протравителями

Универсальный протравитель семян контактного действия с бактерицидными свойствами



Канистра 10 л



Срок годности 2 года
от -15 до +30 °C

Механизм действия

Тирам обладает контактным действием и ингибирует синтез белков в клетках грибов, останавливая процесс прорастания спор и начальный рост мицелия. Благодаря малой подвижности концентрируется в прикорневой зоне, обеспечивая надежную защиту от корневых гнилей.

Спектр действия

Пшеница яровая и озимая — фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян.

Кукуруза — пузырчатая и пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, бактериоз.

Период защитного действия

ТМТД обеспечивает защиту от наружной семенной и почвенной инфекции до фазы кущения зерновых.

Возможность возникновения резистентности

Благодаря неспецифичному, неизбирательному механизму действия выработка резистентности маловероятна.

Рекомендации по применению

Обработку семян ТМТД проводят на протравочных машинах перед посевом или заблаговременно (до 7 месяцев). Расход рабочей жидкости составляет 10 л/т. При протравливании свежееубранных семян озимых с повышенной влажностью норму расхода рабочего раствора необходимо снизить. Чтобы обеспечить высокое качество протравливания, необходимо выполнять следующие условия:

- семена должны быть без повреждений, очищены от пыли и примесей
- необходимо регулярно контролировать равномерность покрытия семян по степени окрашивания и норме расхода препарата.

Совместимость

Совместим с другими протравителями и микроудобрениями, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/т	Вредный объект	Способ применения
Пшеница яровая, озимая	2,5 - 3,0	Фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян	Протравливание семян заблаговременно (2-7 месяцев) или перед посевом (7-14 дней). Расход рабочей жидкости - 10 л/т.
Кукуруза	4	Пузырчатая и пыльная головня, гельминтоспориозная корневая гниль, фузариозная корневая гниль, плесневение семян, бактериоз	Протравливание семян за 2-15 дней до посева или заблаговременно (2-7 месяцев). Расход рабочей жидкости - 10 л/т.

Стингер, КС

60 г/л тебуконазола

- Системный протравитель семян зерновых культур
- Исключительная эффективность против видов головни
- Эффективен против поверхностной и внутренней семенной инфекции
- Способствует формированию сильных растений
- Обладает продолжительным защитным действием

Универсальный протравитель семян контактного действия с бактерицидными свойствами



Канистра 5 л



Срок годности 2 года
от -10 до +40 °C

Механизм действия

Тебуконазол вызывает гибель гриба вследствие ингибирования синтеза эргостерина, являющегося основным строительным материалом клеток грибов. Действующее вещество способно проникать в зародыш семени. В момент его набухания и прорастания обеспечивает защиту от поверхностной и внутрисеменной инфекции.

Спектр действия

Виды головни, фузариозные и гельминтоспориозные корневые гнили, плесневение семян, септориоз (ранняя аэрогенная инфекция).

Период защитного действия

Стингер обеспечивает надежную защиту всходов от момента посева до фазы кущения. Препарат способен подавлять раннюю аэрогенную инфекцию (септориоз, мучнистая роса, ржавчина).

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения резистентности обработки препаратом следует чередовать с препаратами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Обработку семян Стингером проводят на протравочных машинах перед посевом или заблаговременно (до 6 месяцев). Расход рабочей жидкости составляет 10 л/тону семян. При протравливании свежесобраных семян озимых с повышенной влажностью норму расхода рабочего раствора необходимо снизить. Чтобы обеспечить высокое качество протравливания, необходимо выполнять следующие условия:

- семена должны быть без повреждений, очищены от пыли и примесей
- нужно регулярно контролировать равномерность покрытия семян по степени окрашивания и норме расхода препарата.

Приготовление рабочей жидкости:

- наполните бак протравочной машины на 1/2 необходимого объема водой и включите перемешивающее устройство
- встряхните канистру с препаратом
- добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата Стингер и другие компоненты баковой смеси
- добавьте оставшееся количество воды
- перемешивание должно происходить в течение всего периода приготовления рабочей жидкости и процесса протравливания

Рабочий раствор можно использовать только в первые сутки после приготовления.

Совместимость

Совместим с другими протравителями и микроудобрениями, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/т	Вредный объект	Способ применения
Пшеница яровая и озимая	0,4 - 0,5	Пыльная головня, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, плесневение семян	Обработка семян за 7-14 дней до посева. Расход рабочей жидкости – 10 л/т.
	0,4	Твердая головня	
Пшеница озимая	0,5	Фузариозная снежная плесень	
Ячмень яровой и озимый	0,4	Каменная головня	
	0,5	Пыльная головня, ложная пыльная головня, сетчатая пятнистость	
	0,4 - 0,5	Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	
Овёс		Пыльная головня, покрытая головня, плесневение семян, красно-бурая пятнистость, гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили	
		Гельминтоспориозная и фузариозная корневые гнили, плесневение семян	
Лён-долгунец	0,4 - 0,5	Антракноз, крапчатость, бактериоз	

Стингер Трио, КС

80 г/л тиабендазола + 60 г/л тебуконазола + 60 г/л имазазила

- Защита от поверхностной и внутрисеменной инфекции
- Защита от корневых и прикорневых гнилей
- Продолжительный период защитного действия

Системный многокомпонентный протравитель семян широкого спектра действия для борьбы с болезнями зерновых культур



Канистра 5 л



Срок годности 2 года от -10 до +40 °С

Механизм действия

Тебуконазол обладает системным действием и подавляет поверхностную и внутрисеменную инфекцию. Механизм действия основан на подавлении биосинтеза эргостерина, что приводит к необратимым нарушениям в мембранах клеток патогенов. В момент набухания-прорастания зерновки тебуконазол подавляет внутрисеменную инфекцию, затем передвигается к точкам роста, обеспечивая защиту корней и всходов от поражения почвенной инфекцией.

Тиабендазол обладает меньшей подвижностью и концентрируется в основном в прикорневой зоне, обеспечивая надежную защиту от корневых гнилей, а также снежной плесени. Нарушает процесс деления ядра, тормозит репродуктивную способность грибов, вызывая гибель патогенов.

Имазазил ингибирует биосинтез эргостерина на стадии деметилирования, нарушает избирательную проницаемость клеточных мембран патогена.

Отличается высокой активностью против фузариозных и гельминтоспориозных корневых гнилей.

Спектр действия

Твердая головня, пыльная головня, покрытая головня овса, фузариозная и гельминтоспориозная корневые гнили, ризоктониозная прикорневая гниль, снежная плесень, мучнистая роса, бурая ржавчина, септориоз, сетчатая пятнистость ячменя, плесневение семян.

Период защитного действия

Стингер Трио обеспечивает защиту зерновых культур до стадии кущения (ВВСН 29).

Возможность возникновения резистентности

Благодаря наличию трех действующих веществ, относящихся к различным химическим классам и обладающих различными механизмами действия, возникновение устойчивых популяций патогенов маловероятно.

Рекомендации по применению

Обработку семян Стингер Трио проводят на протравочных машинах перед посевом или заблаговременно (до 7 месяцев). Расход рабочей жидкости составляет 10 л/т.

При протравливании свежесобраных семян озимых с повышенной влажностью норму расхода рабочего раствора необходимо снизить. Чтобы обеспечить высокое качество протравливания, необходимо выполнять следующие условия:

- семена должны быть без повреждений, очищены от пыли и примесей
- нужно регулярно контролировать равномерность покрытия семян по степени окрашивания и норме расхода препарата.

Совместимость

Стингер Трио совместим с большинством инсектицидных протравителей, а также микроудобрениями, применяемыми совместно с протравителями. Однако в каждом конкретном случае рекомендуется проверка на совместимость.

Приготовление рабочей жидкости:

- наполните бак протравочной машины на 1/2 необходимого объема водой и включите перемешивающее устройство
 - встряхните канистру с препаратом
 - добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата Стингер Трио и другие компоненты баковой смеси
 - добавьте оставшееся количество воды
 - перемешивание должно происходить в течение всего периода приготовления рабочей жидкости и процесса протравливания
- Рабочий раствор можно использовать только в первые сутки после приготовления.

Культура	Норма расхода, л/т	Вредный объект	Способ применения
Пшеница яровая и озимая	0,4 - 0,5	Твердая головня, пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян	Протравливание семян с увлажнением перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости – 10 л/т.
Ячмень яровой		Каменная головня, пыльная головня, ложная пыльная головня, фузариозная корневая гниль, гельминтоспориозная корневая гниль, плесневение семян, полосатая и темно-бурая пятнистости	

Экселент, КС

250 г/л пикоксистробина

- Протравитель локально-системного действия с физиологическим эффектом
- Подавляет основные болезни бобовых, передающихся семенами
- Стимулирует корнеобразование и обеспечивает дружные всходы
- Не фитотоксичен в отношении обрабатываемой культуры

Системный монокомпонентный протравитель семян широкого спектра действия



Канистра 5 л



Срок годности 2 года от -10 до +40 °С

Механизм действия

Механизм действия пикоксистробина основан на нарушении энергетического обмена в клетках грибов за счет блокирования переноса электронов от цитохрома *bk* к цитохрому *c*. Данный механизм способствует остановке роста мицелия и гибели патогена.

Спектр действия

Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание, серая гниль люпина и гороха.

Период защитного действия

Препарат начинает действовать в момент набухания-прорастания семян и защищает всходы от семенной и почвенной инфекции до 51 дня.

Возможность возникновения резистентности

При использовании препарата следует строго соблюдать рекомендованные регламенты и чередовать фунгициды с различным механизмом действия.

По данным Комитета по устойчивости патогенов к фунгицидам ФАО (FRAC) известны случаи формирования устойчивых популяций патогенов возбудителей мучнистой росы, септориоза и фузариоза зерновых культур к стробилуринам после их систематического применения в течение 3-х сезонов.

Рекомендации по применению

Обработку семян протравителем Экселент проводят на протравочных машинах перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости составляет 10 л/т. Чтобы получить высокое качество протравливания, необходимо выполнять следующие правила:

- семена должны быть без повреждений, очищены от пыли и примесей
- нужно регулярно контролировать качество равномерности покрытия семян по степени окрашивания и норме расхода препарата.

Приготовление рабочей жидкости:

- наполните бак протравочной машины на 1/2 необходимого объема воды и включите перемешивающее устройство
- тщательно перемешайте препарат в заводской таре
- добавьте рассчитанное и отмеренное количество препарата и при необходимости другие препараты (предварительно проверенные на совместимость)
- доведите объем рабочего раствора водой до требуемой нормы
- перемешивание должно происходить во время приготовления рабочей жидкости и процесса протравливания.

Рабочий раствор необходимо использовать только в день приготовления.


Совместимость

Совместим с фунгицидными и инсектицидными протравителями семян, а также микроудобрениями. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/т	Вредный объект	Способ применения
Соя	0,4 - 0,5	Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, фузариозное увядание	Протравливание семян перед посевом или заблаговременно. Расход рабочей жидкости - 10 л/т.
Люпин		Серая гниль, фузариозная корневая гниль, фузариозное увядание	
Горох		Фузариозная корневая гниль, аскохитоз, серая гниль	

Фунгициды

Альпари, КЭ.....	40
Профикс, КЭ	42
Тебумет, КЭ НОВИНКА	44
ТриЗаРа Супер, КЭ НОВИНКА	46
Фолиант, КЭ НОВИНКА	48
Экселент, КС.....	50



Альпари, КЭ

250 г/л пропиконазола +
80 г/л ципроконазола

Фунгициды

Комбинированный фунгицид системного действия



Канистра 5 л



Срок годности 2 года
от -15 до +35 °С

- Комбинированный фунгицид системного действия
- Подавляет основные болезни зерновых культур и сахарной свеклы в период вегетации
- Обладает лечебным и профилактическим действием
- Универсальные и гибкие сроки применения
- Быстрое начальное действие и долговременная защита

Механизм действия

Действующие вещества проникают в растение и распространяются акропетально: снизу вверх по стеблю и от основания листа к его вершине. С этого момента начинается его действие на возбудителя болезни. Ципроконазол обладает высокой системностью и останавливает заражение в течение 2-3 дней. Пропиконазол обладает меньшей системностью и обеспечивает надёжное профилактическое действие. Благодаря синергетическому эффекту Альпари обеспечивает эффективную защиту культуры до 4-х недель.

Спектр действия

На зерновых: ржавчина бурая, стеблевая, желтая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса, гельминтоспориозные пятнистости, ринхоспориоз, корончатая ржавчина овса. **На сахарной свекле:** церкоспороз, фомоз, мучнистая роса.

Скорость воздействия

Препарат обладает быстрым действием, проникает в растение в течение 2-х часов с момента обработки.

Период защитного действия

Защитный эффект сохраняется 3-4 недели при соблюдении рекомендаций по применению.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения резистентности обработки препаратом следует чередовать с фунгицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Обработку фунгицидом Альпари следует проводить профилактически или при обнаружении первых видимых симптомов болезней. Только в этом случае можно получить высокую эффективность и максимальный срок защитного действия.

Используйте достаточное количество рабочей жидкости (300 л/га) для того, чтобы обеспечить полное смачивание листовой поверхности. Добавление суперсмачивателя Агент С в концентрациях 0,1 - 0,05 % позволяет увеличить площадь эффективного покрытия листовой поверхности культуры за счет изменения поверхностного натяжения капель раствора.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница яровая и озимая	0,4 - 0,5	Ржавчина бурая, ржавчина желтая, ржавчина стеблевая, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Ячмень яровой и озимый		Гельминтоспориозные пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая), мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз	
Рожь озимая		Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ринхоспориоз, септориоз	
Овес		Корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость	
Свекла сахарная	0,5 - 0,7	Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации: первое – при появлении первых признаков заболевания, второе через 10-14 дней (при необходимости). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Профикс, КЭ

250 г/л пропиконазола

- Высокая эффективность против широкого спектра болезней
- Обладает защитным и лечебным действием
- Прекрасно сочетается в баковых смесях с гербицидами, инсектицидами и регуляторами роста

Фунгицид системного действия для защиты от болезней на зерновых культурах



Канистра 5 л



Срок годности 2 года от -15 до +35 °C

Механизм действия

Пропиконазол обладает системными свойствами, он проявляет лечебную и защитную активность и вызывает гибель гриба путем ингибирования синтеза эргостерина - соединения, незаменимого для грибной клетки.

Спектр действия

Ржавчина бурая, ржавчина жёлтая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, гельминтоспориозные пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая), ржавчина карликовая, ринхоспориоз, ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость.

Скорость воздействия

Препарат обладает быстрым действием, проникает в растение в течение 2-х часов с момента обработки.

Период защитного действия

Продолжительность защитного действия зависит от степени развития болезни на момент обработки, погодных условий. Защитный эффект сохраняется до 4-х недель.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения резистентности обработки препаратом следует чередовать с фунгицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Обработку фунгицидом Профикс следует проводить профилактически или при обнаружении первых видимых симптомов болезней. Только в этом случае можно добиться максимальной эффективности и срока защитного действия. Интервал между обработками культур зависит от восприимчивости сорта, степени развития болезни и погодных условий.

Используйте достаточное количество рабочей жидкости для того, чтобы обеспечить полное смачивание листовой поверхности. Добавление суперсмачивателя Агент С в концентрациях 0,1 - 0,05 % позволяет повысить площадь эффективного покрытия листовой поверхности культуры за счет изменения поверхностного натяжения раствора.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница яровая и озимая	0,5	Мучнистая роса, ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина жёлтая, септориоз, гельминтоспориозная пятнистость	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га.
Ячмень яровой и озимый		Сетчатая пятнистость, мучнистая роса, ржавчина карликовая, ржавчина желтая, ржавчина (линейная) стеблевая, ринхоспориоз	
Рожь озимая		Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, септориоз, ринхоспориоз, церкоспореллёз, мучнистая роса	
Овес		Мучнистая роса, корончатая ржавчина, красно-бурая пятнистость	

Тебумет, КЭ*

100 г/л дифеноконазола +
50 г/л метконазола

Фунгицид системного действия
для защиты от широкого спектра болезней
на зерновых и на рапсе



Канистра 5 л



Срок годности 2 года
от -15 до +35 °С

Преимущества Тебумета на зерновых

- Обладает лечебным и профилактическим действием
- Широкий спектр контролируемых болезней, в том числе фузариоз колоса
- Позволяет формировать компактные растения

Преимущества Тебумета на рапсе

- Осуществляет контроль болезней
- Повышает зимостойкость
- Обеспечивает оптимальную густоту стояния
- Позволяет формировать мощную корневую систему

Механизм действия

Оба действующих вещества, входящих в состав Тебумета, относятся к классу триазолов.

Дифеноконазол быстро проникает в растение и распространяется по стеблю и от основания листа к его вершине. Обладает лечебным и профилактическим действием против грибов из родов аскомицетов, базидиомицетов и дейтеромицетов.

Метконазол ингибирует синтез эргостирола в клетках грибов, что ведет к остановке роста и разрушению клеточных мембран. Обладает лечебным и профилактическим действием. На рапс при применении по вегетации оказывает росторегулирующее действие.

Спектр действия

На зерновых: фузариоз колоса.

Рапс озимый и яровой: альтернариоз, фомоз, повышение устойчивости к полеганию.

Скорость воздействия

Тебумет распределяется по растению в течение 2-х часов после обработки.

Период защитного действия

Продолжительность защитного действия зависит от степени развития болезней на момент обработки и погодных условий. Как правило, защитный эффект сохраняется на срок до 4-х недель.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения резистентности обработки препаратом следует чередовать с фунгицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Обработку фунгицидом Тебумет следует проводить профилактически или по первым видимым симптомам болезней. При обработке следует

использовать достаточное количество воды, чтобы обеспечить полное смачивание листовой поверхности. Добавление суперсмачивателя Агент С в концентрациях 0,1 – 0,05 % рабочего раствора, позволяет повысить эффективность покрытия листовой поверхности культуры.

Для формирования мощной корневой системы и повышения зимостойкости обработку озимого рапса проводят осенью в фазу 6-ти листьев.

В весенний период Тебумет применяют для управления архитектурой растений рапса совместно с гербицидами или самостоятельно.

Росторегулирующее действие выражается в снижении высоты растений, образовании большего числа боковых побегов.

Обработку против фузариоза колоса проводят профилактически в фазу начала появления пыльников зерновых.

Совместимость

Тебумет совместим с большинством гербицидов, инсектицидов, фунгицидов и микроудобрений с нейтральной реакцией раствора, применяемыми в те же сроки.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница яровая и озимая	0,8 - 1,0	Фузариоз колоса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га.
Рапс яровой и озимый		Альтернариоз, фомоз	Опрыскивание в период вегетации при появлении первых признаков болезней, последующая обработка через 10-14 дней (фаза вытягивания стеблей - начало образования стручков в нижнем ярусе). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.

ТриЗаРа Супер, КЭ*

267 г/л прохлораза + 100 г/л тебуконазола + 83 г/л азоксистробина

Контактно-системный фунгицид с выраженным физиологическим эффектом, действует на возбудителей болезней на разных стадиях развития



Канистра 5 л



Срок годности 2 года от -15 до +35 °С

НОВИНКА!

- Контактно-системный фунгицид с выраженным физиологическим эффектом
- Быстро подавляет возбудителей болезней на разных этапах их развития
- Обладает защитным, лечебным и искореняющим действием
- Продолжительный период защиты
- Оптимизирует азотное питание
- Компенсирует негативное воздействие стрессовых факторов

Механизм действия

Прохлораз обладает трансламинарным действием, ингибирует биосинтез стерина в мембранах клеток грибов, блокируя проникновение инфекции (профилактическое действие). Тебуконазол проявляет системную активность. Является ингибитором биосинтеза эргостерина, входящего в состав клеточной мембраны грибов.

Азоксистробин обладает контактно-системным действием, проявляет длительный защитный эффект и уничтожает патоген на стадии заражения, ингибируя митохондриальное дыхание.

Спектр действия

Зерновые – ржавчина бурая, ржавчина жёлтая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, гельминтоспориозные пятнистости (темно-бурая, сетчатая, полосатая), ржавчина карликовая, ринхоспориоз, ржавчина корончатая, красно-бурая пятнистость; **сахарная свёкла** – церкоспороз, фомоз, мучнистая роса; **соя** - антракноз, аскохитоз, пероноспороз.

Скорость воздействия

Препарат обладает быстрым действием, проникает в растение в течение 2-х часов с момента обработки.

Период защитного действия

Продолжительность защитного действия зависит от степени развития болезни на момент обработки, погодных условий и культуры. Как правило, защитный эффект сохраняется до 4-х недель.

Возможность возникновения резистентности

Препарат содержит действующие вещества разной химической природы, возникновение резистентности маловероятно.

Рекомендации по применению

Обработку фунгицидом ТриЗаРа Супер следует проводить профилактически или по первым видимым симптомам болезней. Только в этом случае можно получить высокую эффективность и максимальный срок защитного действия.

Используйте достаточное количество рабочей жидкости для того, чтобы обеспечить полное смачивание листовой поверхности. Добавление суперсмачивателя Агент С в концентрациях 0,1 - 0,05 % позволяет повысить эффективную площадь покрытия листовой поверхности культуры.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с щелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница яровая и озимая	0,8 - 1,5	Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, ржавчина желтая, септориоз листьев и колоса, мучнистая роса, ломкость стеблей, пиренофороз, темно-бурая пятнистость, фузариоз колоса, чернь колоса	Опрыскивание в период вегетации: первое - при появлении первых признаков болезней, второе – через 10-14 дней (при необходимости). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.
Ячмень яровой и озимый		Ржавчина стеблевая, ржавчина карликовая, ломкость стеблей, мучнистая роса, гельминтоспориозные пятнистости листьев (сетчатая и темно-бурая), ринхоспороз, фузариоз колоса, чернь колоса.	
Сахарная свёкла		Церкоспороз, фомоз, мучнистая роса	
Соя		Антракноз, аскохитоз, пероноспороз	

Фолиант, КЭ*

125 г/л тебуконазола +
100 г/л триадимефона

Системный фунгицид профилактического
и лечебного действия



Канистра 5 л



Срок годности 2 года
от -15 до +35 °С

- Контролирует широкий спектр листовых болезней зерновых
- Контролирует церкоспороз и фомоз сахарной свеклы

Механизм действия

Оба действующих вещества относятся к классу триазолов и являются ингибиторами биосинтеза эргостерина, входящего в состав клеточных мембран грибов.

Тебуконазол обладает выраженными системными свойствами, распространяется по растению и обеспечивает остановку роста мицелия грибов.

Триадимефон проявляет системную активность. Активно поглощается листьями и перемещается по растению акропетально. Гибель грибов происходит на стадии образования гаусторий и формирования аппрессориев и визикул.

Спектр действия

На зерновых: бурая и стеблевая ржавчина, желтая ржавчина, септориоз листьев и колоса, пиренофороз, сетчатая пятнистость ячменя, мучнистая роса, ринхоспориоз.

На сахарной свекле: церкоспороз, мучнистая роса, фомоз.

Скорость воздействия

Остановка роста и развития мицелия грибов происходит в первые 24 часа.

Период защитного действия

Продолжительность защитного действия зависит от степени развития болезни на момент обработки, погодных условий и культуры. Как правило, защитный эффект сохраняется до 4-х недель.

Возможность возникновения резистентности

Во избежание возникновения резистентности следует чередовать фунгициды из разных химических классов.

Рекомендации по применению

Обработка Фолиантом проводится профилактически или по первым видимым симптомам болезней. При обработке следует использовать достаточное количество воды, чтобы обеспечить полное смачивание листовой поверхности. Добавление суперсмачивателя Агент-С в кон-

центрациях 0,1 – 0,05 % рабочего раствора повышает эффективность покрытия листовой поверхности.

Обработки по флаговому листу при появлении первых признаков болезней зерновых обеспечивает активное подавление болезней независимо от степени поражения на момент обработки.

Обработку сахарной свеклы против церкоспороза проводят при интенсивности поражения не более 5 %. Повторная обработка может потребоваться через 20-30 дней.

Совместимость

Фолиант совместим с большинством гербицидов, фунгицидов и микроудобрений, применяемых в те же сроки, за исключением продуктов с кислой и щелочной реакцией раствора.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница яровая и озимая	0,8 - 1,0	Бурая ржавчина, стеблевая ржавчина, желтая ржавчина, мучнистая роса	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 300 л/га.
	1,0 - 1,25	Септориоз листьев и колоса, пиренофороз	
Ячмень яровой	1,0	Ржавчина карликовая, мучнистая роса, сетчатая пятнистость	
Рожь		Ржавчина бурая, ржавчина стеблевая, мучнистая роса, ринхоспориоз	
Свекла сахарная	0,45 - 0,6	Церкоспороз, мучнистая роса, фомоз	Опрыскивание в период вегетации: первое – профилактическое, последующее – с интервалом 10-14 дней. Расход рабочей жидкости – 300 л/га.

Экселент, КС

250 г/л пикоксистробина

- Обладает выраженным озеленяющим эффектом при применении в период бутонизации сои
- Проявляет трансламинарную активность
- Обладает лечебными и профилактическими свойствами

Профилактический фунгицид
с физиологическим действием



Канистра 5 л



Срок годности 2 года
от -10 до +40 °С

Механизм действия

Механизм действия пикоксистробина основан на нарушении энергетического обмена в клетках грибов за счет блокирования переноса электронов от цитохрома *b_k* к цитохрому *c*. Данный механизм способствует остановке роста мицелия и гибели патогена.

Спектр действия

Альтернариоз, антракноз, фузариоз, ложная мучнистая роса, септориоз.

Скорость воздействия

Пикоксистробин быстро проникает в растение через листья и стебли в течение нескольких часов после обработки и перемещается акропетально.

Период защитного действия

Препарат защищает культуру от болезней в течение длительного периода, период защитного действия может достигать 51 день.

Возможность возникновения резистентности

По данным Комитета по устойчивости патогенов к фунгицидам ФАО (FRAC) известны случаи формирования устойчивых популяций патогенов возбудителей мучнистой росы, септориоза и фузариоза зерновых культур к стробилуринам после их систематического применения в течение 3-х сезонов. Поэтому при применении препарата следует строго соблюдать рекомендованные регламенты и чередовать фунгициды с различным механизмом действия.

Рекомендации по применению

Обработку фунгицидом Экселент следует проводить профилактически или при появлении первых симптомов болезней. Для обеспечения физиологического эффекта Экселент следует применять в фазу бутонизации — начала цветения, при условии отсутствия стрессов.

До бутонизации при сильном повреждении вредителями или механическом повреждении стимулирование за счёт фито эффекта

Совместимость

Препарат совместим со многими инсектицидами, гербицидами, агрохимикатами и регуляторами роста, применяемыми в те же сроки на защищаемых культурах.

В каждом конкретном случае необходимо проверять смешиваемые компоненты на совместимость и фитотоксичность по отношению к обрабатываемым растениям.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Соя	0,5 - 0,8	Альтернариоз, фитофтороз, антракноз, аскохитоз, ложная мучнистая роса, септориоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков болезней, последующие обработки – при необходимости с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.
Люпин		Альтернариоз, антракноз, аскохитоз, ложная мучнистая роса, септориоз	Опрыскивание в период вегетации профилактически или при появлении первых признаков болезней, последующие – при необходимости с интервалом 14 дней. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.
Горох			

Инсектициды

Айвенго, КЭ	54
Клипер, КЭ.....	56
Клонрин, КЭ.....	58
Метомакс, КС.....	62
Прокроп, КЭ.....	64
Таран, ВЭ	68
Тиамакс, КС	70
Циперус, КЭ.....	72



Айвенго, КЭ

100 г/л альфа-циперметрина

- Инсектицид широкого спектра действия
- Активен против абсолютного большинства насекомых-вредителей
- Эффективен на всех стадиях развития насекомых
- Устойчив к смыванию осадками
- Применяется в малых дозах

Инсектицид из группы синтетических пиретроидов, предназначенный для борьбы с широким спектром насекомых-вредителей, в том числе с проблемными и специфическими вредителями



Канистра 5 л



Срок годности 2 года
от -15 до +25 °С

Механизм действия

Обладает выраженным контактно-кишечным действием с высокой начальной биологической активностью. Альфа-циперметрин воздействует на нервную систему насекомых, нарушая проницаемость клеточных мембран и блокируя натриевые каналы, что вызывает остановку питания и гибель вследствие паралича.

Спектр действия

Листоеды, клоп вредная черепашка, луговой мотылек, тля, трипс, цикадка выюнковая, колорадский жук, мучной клещ, бурый плодовый клещ.

Скорость действия

Остановка питания происходит в первые 10-15 минут после обработки, полная гибель в течение 2-3 часов.

Период защитного действия

7-10 дней в зависимости от погодных условий и численности вредителей.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения резистентности обработки препаратом следует чередовать с препаратами из других химических групп.

Совместимость

Айвенго совместим с большинством гербицидов, фунгицидов и стимуляторов роста, применяемых в те же сроки. Однако в каждом конкретном случае рекомендуется проводить проверку на совместимость в малом объеме рабочего раствора.

Рекомендации по применению

Айвенго показывает высокую эффективность при применении в начале заселения вредителями, с учётом порога экономической вредоносности. Норма расхода рабочей жидкости должна быть достаточной для обеспечения покрытия всей поверхности культуры. Обработку следует проводить в утренние или вечерние часы при температуре +12...+25 °С.

При применении на крестоцветных, бобовых, овощных и плодовых культурах рекомендуется добавлять в рабочий раствор суперсмачиватель Агент С 50-100 мл/га, который улучшает покрытие растений препаратом.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница яровая и озимая	0,1 - 0,15	Клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га.
Пшеница яровая и озимая	0,1	Блошки, трипсы, цикадки, пъявица	
Рапс яровой и озимый (зерно, масло)	0,1 - 0,15	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки	
Свёкла сахарная	0,1	Свекловичная листовая тля, свекловичная минирующая муха	
Горох	0,1	Гороховая зерновка, гороховая плодоярка, гороховая тля	

Клипер, КЭ

100 г/л бифентрина

- Высокая эффективность против различных насекомых и клещей
- Мгновенное подавление жизнедеятельности вредных насекомых
- Пролонгированное действие за счет термо- и фотостабильности бифентрина
- Комплексное действие против различных отрядов насекомых и клещей

Инсектоакарицид группы синтетических пиретроидов третьего поколения



Канистра 1 л и 5 л



Срок годности 3 года
от -5 до +40 °С

Механизм действия

По механизму действия является контактно-кишечным инсектоакарицидом. Бифентрин блокирует ионный обмен в синапсах натрий-калиевых каналов нервной клетки насекомых, что приводит к нарушению функций ЦНС и поражению двигательных центров.

Гибель происходит в результате паралича и нервного перевозбуждения. Действует на все стадии развития насекомого — от отрождающихся личинок до имаго. Проявляет нокдаун-эффект.

Спектр действия

Капустная моль, паутинный клещ; стволовые вредители хвойных и лиственных деревьев, стволовые и технические вредители заготовленной древесины.

Скорость действия

Препарат обладает высокой скоростью действия. Насекомые прекращают питаться через 10-15 минут после обработки и погибают в течение 1-2 часов.

Период защитного действия

2-3 недели в зависимости от численности вредителей.

Возможность возникновения резистентности

Необходимо чередовать с инсектицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Клипер показывает высокую эффективность при применении в начале заселения вредителями, с учётом порога экономической вредности.

Обработку против паутинного клеща следует проводить двукратно. Первую - при численности вредителя 5 шт на одном листе или заселении 10 % растений. При температурах воздуха выше 22 °С повторную обработку следует проводить с интервалом 5 - 7 дней.

Норма расхода рабочей жидкости должна быть достаточной для обеспечения покрытия всей поверхности культуры.

При высокой численности вредителей в рабочий раствор добавляют суперсмачиватель Агент С 50-100 мл/га, который улучшает покрытие растений препаратом и усиливает действие на тлей и клещей.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Рапс яровой и озимый	0,2 - 0,3	Капустная моль	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га
Соя	0,2 - 0,3	Паутинный клещ	
Заготовленная древесина штабелях	2 - 3 мл/100 м ² поверхности штабеля	Стволовые и технические вредители, в т.ч. короед-типограф, шестизубчатый короед и уссурийский полиграф	Опрыскивание заготовленной древесины в штабелях в период лёта взрослых особей стволовых вредителей. Норма расхода рабочего раствора - 2 л/100 м ²
Хвойные и лиственные лесообразующие породы, в т. ч. пихта, кедр, сосна	2 - 3 мл/100 м ² поверхности коры		Опрыскивание в период вегетации и лёта взрослых особей. Норма расхода рабочего раствора - 2 л/100 м ²

Клонрин, КЭ

150 г/л клотианидина +
100 г/л зета-циперметрина

- Контактно-кишечный инсектицид для борьбы с широким спектром вредителей
- Обеспечивает уничтожение комплекса вредителей
- Обладает быстрым действием на насекомых.
- Длительный период защитного действия
- Эффективен против резистентных к пиретроидам популяций насекомых

Контактно-кишечный инсектицид
для борьбы с широким спектром
вредителей



Канистра 5 л



Срок годности 2 года
от -15 до +35 °С

Механизм действия

Клотианидин обладает контактно-кишечной активностью, подавляет ацетилхолинэстеразу, является агонистом никотин-ацетилхолиновых рецепторов постсинаптической мембраны нервной клетки.

Зета-циперметрин блокирует ионный обмен в синапсах натрий-калиевых каналов нервной клетки насекомых. Комбинированный механизм действия позволяет Клонрину эффективно бороться с широким спектром вредителей.

Спектр действия

Клоп вредная черепашка, пьявица, тля, хлебные жуки, трипсы, хлебная жужелица, рапсовый цветоед, саранчовые (в период массового отрождения личинок), акациевая огневка, луговой мотылек, свекловичные блошки, долгоносики, свекловичная листовая тля, луговой мотылек, хвое- и листогрызущие вредители, в т. ч. непарный шелкопряд, сосновый пилильщик и самшитовая огнёвка.

Скорость действия

Дезориентация насекомых и остановка питания происходит в течение нескольких минут после применения Клонрина. Полная гибель наступает в течение первых суток.

Период защитного действия

Период защитного действия препарата 2-3 недели, в зависимости от вида, численности вредителей и погодных условий.

Возможность возникновения резистентности

Возникновение резистентности маловероятно.

Рекомендации по применению

Клонрин показывает высокую эффективность при применении в начале заселения вредителями, с учётом порога экономической вредоносности. Клонрин не обладает избирательным действием и, помимо специализированных, он также подавляет и многоядных вредителей: стеблевого мотылька, озимую совку,

совку-гамму, если обработка проводится в период начала массовой откладки яиц. Норма расхода рабочей жидкости должна быть достаточной для обеспечения покрытия всей поверхности культуры. Обработку следует проводить в утренние или вечерние часы при температуре +12 ... +30 °С. Разрешено авиационное применение, в т. ч. с использованием легкомоторных самолетов. При авиационном применении обязательно использовать препарат совместно с Авилор Авиа. При применении на крестоцветных, бобовых и овощных культурах рекомендуется добавлять в рабочий раствор суперсмачиватель Агент С, 50 - 100 мл/га, который улучшает покрытие растений препаратом.

Совместимость

Клонрин совместим с большинством пестицидов, за исключением имеющих сильнощелочную или сильнокислую реакцию. Однако в каждом конкретном случае смешиваемые препараты следует проверять на совместимость и фитотоксичность.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница озимая	0,1 – 0,2	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га.
Пшеница, ячмень	0,1 – 0,2 (А)	Клоп вредная черепашка, хлебные жуки, трипсы, тли, пьявица	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-400 л/га, при авиационном – 10-50 л/га, включая ультрамалообъемное 3-25 л/га.
Рапс	0,1 - 0,2	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-400 л/га.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Рапс	0,1 - 0,2 (А)	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости при авиационном применении – 10-50 л/га, включая ультрамалообъемное 3-25 л/га.
Соя	0,1 - 0,2	Акациевая огнёвка, луговой мотылек	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-400 л/га.
Свёкла сахарная	0,1 - 0,2	Свекловичные блошки, долгоносики	Опрыскивание всходов. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га.
		Свекловичная листовая тля, луговой мотылёк	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га.
Пастбища, участки, заселённые саранчовыми, дикая растительность	0,1 - 0,2 0,1 - 0,2 (А)	Саранчовые	Опрыскивание в период массового отрождения личинок.
			Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях – не ранее 14 дней после обработки. Сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-400 л/га.
			Срок возможного пребывания людей на обработанных препаратом площадях – не ранее 14 дней. Сбор грибов и ягод в сезон обработки не разрешается. Расход рабочей жидкости 10-50 л/га, включая ультрамалообъемное опрыскивание 3-25 л/га.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Хвойные и лиственные породы	0,06 - 0,09 л/га	Листогрызущие вредители, в т.ч. непарный шелкопряд, сосновый пилильщик и самшитовая огневка	Опрыскивание в период развития гусениц и личинок младшего возраста. В регионах, где планируется применение препарата, в сезон обработки не рекомендуется сбор грибов, ягод, кедровых шишек. Заблаговременно, не менее чем за 10 дней до начала обработок, население через средства массовой информации должно быть оповещено о необходимых мерах предосторожности, о сроках возможного сенокошения и выпаса животных. На границах подлежащих обработкам площадей устанавливаются щиты с соответствующей информацией. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га.
	0,06 - 0,09 л/га (А)		Опрыскивание в период развития гусениц и личинок младшего возраста. В регионах, где планируется применение препарата, в сезон обработки не рекомендуется сбор грибов, ягод, кедровых шишек. Заблаговременно, не менее чем за 10 дней до начала обработок, население через средства массовой информации должно быть оповещено о необходимых мерах предосторожности, о сроках возможного сенокошения и выпаса животных. На границах подлежащих обработкам площадей устанавливаются щиты с соответствующей информацией. Расход рабочей жидкости – 3-25 л/га, включая ультрамалообъемное опрыскивание.

Метомакс, КС

250 г/л метомила + 25 г/л бифентрина

- Эффективен против всех возрастов личинок, начиная с отрождения до старшего возраста
- Отсутствие резистентности у вредителей
- Длительный период максимальной эффективности
- Не накапливается в продуктах растениеводства
- Широкий спектр контролируемых вредителей
- Действие на все стадии развития насекомых и клещей

Системный инсекто-акарицид контактного и кишечного действия



Канистра 5 л



Срок годности 2 года
от 0 до +30 °C

Механизм действия

Системный и контактно-кишечный инсектицид и акарицид. Метомил ингибирует действие холинэстеразы и подавляет гидролиз ацетилхолина. Вследствие накопления ацетилхолина нарушается нормальное течение процесса передачи нервного импульса в мышечных тканях. Бифентрин действует как модулятор натриевых каналов нервных клеток центральной и периферической нервных систем членистоногих. Блокируя пропуск ионов натрия через мембраны, препятствует передаче нервных импульсов по аксону. В результате возникает судорожная активность мышц, приводящая к параличу.

Спектр действия

Эффективен в борьбе с жесткокрылыми (*Coleoptera*), чешуекрылыми (*Lepidoptera*), равнокрылыми хоботными (*Homoptera*), бахромчатокрылыми (*Thysanoptera*), полужесткокрылыми (*Hemiptera*) и прямокрылыми (*Orthoptera*) и другими вредителями.

Скорость действия

Дезориентация насекомых и остановка питания происходит в течение нескольких минут после применения Метомакса.

Возможность возникновения резистентности

При соблюдении регламентов применения препарата возникновение резистентности маловероятно.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость. Не рекомендуется применять в баковых смесях с агрохимикатами, повышающими pH рабочего раствора.

Рекомендации по применению

Перед применением необходимо встряхнуть канистру.

Метомакс следует применять в рекомендуемых дозировках превентивно в период отрождения первых личинок. Опрыскивание должно обеспечивать равномерное внесение, а количество рабочего раствора на 1 гектар быть достаточным для того, чтобы покрыть всю листовую поверхность. Интервал между обработками обычно составляет 7-12 дней.

Обработку против паутиного клеща следует проводить двукратно, первую — при численности вредителя 5 шт на одном листе или заселении 10 % растений. При температурах воздуха выше 22 °C повторную обработку следует проводить с интервалом 5-7 дней.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Мандарин	1,0 - 1,2	Тли, клещи, клопы, в т. ч. мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600 - 800 л/га.
Фундук		Клещи, клопы, в т. ч. мраморный клоп	
Виноград		Гроздевая листовертка	
Кукуруза		Хлопковая совка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200 - 300 л/га.
Соя	Паутиный клещ		
	Бобовая огневка, гороховая плодоярка, гороховая зерновка, тли		
Горох, нут	Гороховая зерновка, гороховая плодоярка, бобовая огневка, тля		
Подсолнечник		Хлопковая совка	
Яблоня		Яблонная плодоярка, тли, клещи, клопы, в т.ч. мраморный клоп	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 600 - 800 л/га.

Прокроп, КЭ

450 г/л пиримифос-метила +
20 г/л бифентрина

- Высокая эффективность против амбарных вредителей, в т.ч. клещей в явной и скрытой форме заражения
- Действие уже в первые часы после обработки
- Длительный период защитного действия (до 6 месяцев)
- Возможность использования зерна на товарные цели через 24 часа после обработки
- Отсутствие риска резистентности у вредителей

Механизм действия

Пиримифос-метил блокирует фермент холинэстеразу в нервной клетке, нарушая нормальное прохождение нервных импульсов. Бифентрин действует на ионный обмен в синапсах натрий-калиевых каналов нервной клетки. Гибель вредителей наступает в результате паралича и сбоя в работе жизненно важных функций.

Спектр действия

Клещи, амбарный долгоносик, рисовый долгоносик, булавоусый мучной хрущак, малый мучной хрущак, короткоусый мукоед, суринамский мукоед, зерновой точильщик, зерновая моль, мельничная огневка, южная амбарная огневка, мавританская козявка, притворяшки, капровый жук, трогодерма изменчивая.

Скорость действия

Гибель вредителей наблюдается в первые часы после обработки.

Базовый инсектицид для защиты
от вредителей запасов



Канистра 1 л и 5 л



Срок годности 2 года
от -15 до +30 °С

Период защитного действия

Прокроп обеспечивает защитное действие до 6 месяцев.

Возможность возникновения резистентности

Сочетание действующих веществ с разными механизмами действия предотвращает возникновение резистентности.

Рекомендации по применению:

Обработка незагруженных складских помещений: перед применением препарата Прокроп необходимо освободить склад от старой тары и провести тщательную уборку, обращая особое внимание на очистку труднодоступных мест (трещин, щелей). Только в этом случае гарантируется высокая эффективность препарата, при условии соблюдения технологии обработки. Влажная дезинсекция проводится с помощью ручных или моторизированных опрыскивателей. Расход рабочей жидкости до 50 мл/м².

Опрыскивание стен, полов и оборудования, пустых силосов и отсеков для хранения зерна следует проводить непосредственно перед закладкой на хранение зерна нового урожая. Обработанные хранилища перед загрузкой зерна необходимо проветрить. **Влажная обработка зерна:** перед обработкой зерно должно быть подготовлено к хранению, т. е. просушено и очищено от сорных примесей, а хранилище подвергнуто дезинсекции. Обработка зерна осуществляется в потоке, т. е. при перемещении зерна из силоса в силос в элеваторе или из склада в склад, или из одного места в складе на другое место в этом же складе, а также при поступлении зерна в элеватор или при его отгрузке потребителям (экспорт, внутренние перевозки). Обработка производится с использованием ГРИ-гидравлического распылителя инсектицидов, который позволяет обеспечить правильные параметры процесса обработки.

Главная цель – обеспечить покрытие препаратом максимально большего количества зёрен в потоке. Однако нет необходимости добиваться покрытия каждой зерновки, достаточно покрытие одной пятой количества зёрен, что обеспечивает полное обеззараживание зерновой массы в процессе перемешивания.

Необходимо соблюдать равномерность распределения препарата в массе зерна. При подготовке экспортных партий зерно, завезённое из разных мест, смешивается, и возможность заражения увеличивается. Необходимо использовать длительное действие Прокропа и проводить заблаговременное обеззараживание, как минимум за 2 месяца до отгрузки. Допуск людей и загрузка складов разрешены через сутки после обработки.

Обработка складов и хранилищ холодным туманом. Генераторы холодного тумана создают капли рабочего раствора размером до 20 мкм, которые в течение нескольких часов находятся в воздухе, уничтожая летающих насекомых.

По мере оседания тумана капли рабочего раствора проникают в самые мелкие трещины складских помещений и щели в оборудовании, уничтожая ползающих и скрытноживущих вредителей. Обработка производится в закрытом помещении от дальних ворот к выходу. Экспозиция 24 часа.

Срок безопасного выхода людей для проведения ручных работ – 2 дня.

Особенности влажной обработки зерна

- Метод максимально эффективен за счет покрытия всех зерен.
- Минимальный контакт оператора с препаратом. Стандартные средства индивидуальной защиты.
- Распыление инсектицида с помощью специальных аппаратов внутри самотека в поток зерна в любой удобной точке.
- Защитный период длится до 6 месяцев.

1. Влажная обработка зерна на складе


эффективна в любых хранилищах, даже под открытыми навесом:




любой объем загрузки склада не требуется укрывать пленкой не требуется герметизация склада при обработке

2. Влажная обработка зерна в потоке

возможна при любом количестве зерна в силосах и без укрытия насыпей пленками, обрабатывать партии зерна можно по частям:



3. Влажная обработка зерна при загрузке в зернохранилище



Культура, обрабатываемый объект	Норма расхода, л/м ² , л/т семян	Вредный объект	Способ, время обработки, ограничения, особенности применения
Незагруженные складские помещения и оборудование зерноперерабатывающих предприятий	0,4 мл/м ²	Вредители хлебных запасов (насекомые, клещи)	Влажная дезинсекция. Опрыскивание с помощью ручных или моторизованных опрыскивателей. Расход рабочей жидкости — до 50 мл/ м ² . Срок безопасного выхода людей для проведения ручных работ — 1 день после обработки.
			Дезинсекция холодным туманом. Обработка с помощью генераторов холодного тумана. Экспозиция 24 ч. Срок безопасного выхода людей для проведения ручных работ - 2 дня.
Территория зерноперерабатывающих предприятий и зернохранилищ в хозяйствах	0,8 мл/м ²		Влажная дезинсекция. Опрыскивание с помощью ручных или моторизованных опрыскивателей. Расход рабочей жидкости — до 200 мл /кв.м. Срок безопасного выхода людей на обработанную территорию для проведения ручных работ — 1 день.
Зерно продовольственное, семенное, фуражное и семена бобовых и масличных культур	15 мл/т		Опрыскивание при перемешивании зерна с использованием специальных распылителей инсектицидов. Расход рабочей жидкости — до 500 мл на 1 т зерна и семян. Срок безопасного выхода людей — 1 сутки. Использование зерна и семян на продовольственные и фуражные цели при содержании остатков препарата не выше МДУ.

Таран, ВЭ

100 г/л зета-циперметрина

- Разрешен для авиаприменения
- Высокая скорость действия
- Водная основа препарата устраняет проблему фитотоксичности
- Высокая эффективность при высоких температурах
- Период защитного действия составляет 3-4 недели

Контактно-кишечный инсектицид широкого спектра действия



Канистра 5 л



Срок годности 3 года
от 0 до +35 °С

Механизм действия

Обладает контактно-кишечным действием. Блокирует ионный обмен в синапсах натрий-калиевых каналов нервной клетки насекомых.

Спектр действия

Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, хлебные жуки, трипсы, рапсовый цветоед, саранчовые, землянично-малинный долгоносик.

Скорость действия

Гибель насекомых наступает немедленно после обработки.

Период защитного действия

Защищает культурные растения на срок 3-4 недели.

Возможность возникновения резистентности

Необходимо чередовать с инсектицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Таран показывает высокую эффективность при применении в начале заселения вредителями, с учётом порога экономической вредоносности.

Норма расхода рабочей жидкости должна быть достаточной для обеспечения покрытия всей поверхности культуры. Обработку проводить в утренние или вечерние часы при температуре +12 ...+30 °С.

При применении на крестоцветных, бобовых, овощных и плодовых культурах рекомендуется добавлять в рабочий раствор суперсмачиватель Агент С, 50-100 мл/га, который усиливает действие препарата и позволяет уничтожить вредителей в труднодоступных местах.

При применении авиаметодом рекомендуется использовать эмульгатор Авилор, 90 мл/га для равномерности распределения раствора.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Не рекомендуется применять в баковых смесях с агрохимикатами, повышающими pH рабочего раствора.

Культура	Нормы расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения	
Пшеница Ячмень	0,07 - 0,1 0,07 - 0,1 (А)	Клоп вредная черепашка, пьявица, тли, хлебные жуки, трипсы	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости: при наземном опрыскивании – 200-400 л/га, для авиаприменения – 25-50 л/га.	
Рапс, горчица (кроме горчицы на масло)	0,1 0,1 (А)	Рапсовый цветоед		
Пастбища, участки, заселённые саранчовыми	0,1 - 0,15 0,1 (А)	Саранчовые	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 3 дней после обработки; сбор грибов и ягод в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га, для авиаприменения – 25-50 л/га.	
Применение в ЛПХ	Смородина	1 мл/10 л воды (Л)	Тли	Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости – до 1,5 л/куст.
	Малина		Землянично-малинный долгоносик	Опрыскивание в период выдвижения бутонов. Расход рабочей жидкости – до 0,2 л/куст.
	Земляника	0,5 мл/100 м ² (Л)		Опрыскивание в период выдвижения бутонов. Расход рабочей жидкости – до 5 л/100 м ² .

Тиамакс, КС

240 г/л тиаметоксама

- Контролирует широкий спектр вредителей зерновых, сахарной свеклы и рапса
- Эффективность мало зависит от погодных условий
- Обладает трансламинарным и системным эффектом
- Совместим с большинством гербицидов и фунгицидов, применяемых в те же сроки

Инсектицид из класса неоникотиноидов широкого спектра действия



Канистра 5 л



Срок годности 2 года
от -5 до +35 °С

Механизм действия

Тиаметоксам быстро проникает в растение и распространяется по нему. В организм насекомого действующее вещество попадает в момент питания частями растения или с его соком. Тиаметоксам является агонистом ацетилхолинэстеразы: путем открытия натриевых каналов в цепочке передачи нервного импульса вызывает перевозбуждение насекомого с последующим параличем.

Спектр действия

Эффективно контролирует как открыто, так и скрытно питающихся вредителей за счет системного действия.

На зерновых: хлебную жужелицу, клопа вредную черепашку, пьявиц.

На рапсе: рапсового цветоеда.

На сахарной свекле: свекловичных блошек и свекловичного долгоносика.

Скорость действия

Действует в момент питания насекомого.

Период защитного действия

Защитное действие Тиамакса сохраняется от 2-х до 4-х недель в зависимости от обработанного растения, видового состава вредителей и погодных условий.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения резистентности обработки препаратом следует чередовать с препаратами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Тиамакс высокоэффективен при применении в начале заселения вредителями, с учётом ЭПВ. Норма расхода рабочей жидкости должна быть достаточной для обеспечения покрытия всей поверхности культуры. Обработка проводится в утренние или вечерние часы при температуре +12 ... +30 °С. При применении на крестоцветных рекомендуется добавлять в рабочий раствор суперсмачиватель Агент С, 50-100 мл/га, который усиливает действие препарата и позволяет уничтожить вредителей в труднодоступных местах.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией.

Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость. Не рекомендуется применять в баковых смесях с агрохимикатами, повышающими pH рабочего раствора.

Культура	Норма расхода, л/га, л/т	Вредный объект	Способ применения
Пшеница озимая	0,1–0,15	Хлебная жужелица	Опрыскивание всходов осенью. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.
Пшеница яровая и озимая	0,06–0,08	Клоп вредная черепашка, пьявица	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.
Ячмень	0,06–0,08	Пьявица	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.
Рапс яровой	0,1	Рапсовый цветоед	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.
Картофель	0,3-0,4	Колорадский жук, проволочники, ложнопроволочники	Обработка клубней перед посадкой. Расход рабочей жидкости 10 л/т.
	0,06-0,08	Колорадский жук	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 200-400 л/га.
Свёкла сахарная	0,1–0,15	Свекловичные блошки и долгоносики	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости 100-200 л/га.
Яблоня	0,2–0,3	Яблонная медяница	Опрыскивание до цветения. Расход рабочей жидкости 800-1200 л/га.

Циперус, КЭ

250 г/л циперметрина

- Подавляет широкий спектр вредителей основных сельскохозяйственных культур
- Обладает быстрым контактным и кишечным действием
- Устойчив к тепловому воздействию
- Уничтожает вредителей на всех стадиях развития

Контактный инсектицид для борьбы с широким спектром вредителей



Канистра 1 л и 5 л



Срок годности 2 года от -5 до +35 °С

Механизм действия

Инсектицид контактно-кишечного действия блокирует ионный обмен в синапсах натрий-калиевых каналов нервной клетки насекомых, что приводит к нарушению функций ЦНС и поражению двигательных центров. Гибель происходит в результате паралича и нервного перевозбуждения.

Спектр действия

Блошки, злаковая тля, внутристеблевые мухи, клоп вредная черепашка, хлебный жук, злаковая галлица, пьявица, рапсовый цветоед, тли – переносчики вирусных заболеваний, фитонемус, хлебные трипсы, хлебный клопик, хлопковая совка, кукурузный мотылек, луговой мотылек, подгрызающие совки, колорадский жук, саранчовые и др.

Скорость действия

Питание личинок и откладка яиц прекращаются через 10-15 минут. В течение 1-2 часов после обработки вредители перестают передвигаться и погибают.

Период защитного действия

10-15 дней в зависимости от погодных условий и численности вредителей.

Возможность возникновения резистентности

Средняя. Необходимо чередовать с инсектицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Циперус показывает высокую эффективность при применении в начале заселения вредителями, с учётом порога экономической вредоносности. Норма расхода рабочей жидкости должна быть достаточной для обеспечения покрытия всей поверхности культуры. Обработку необходимо проводить в утренние или вечерние часы при температуре +12 ...+25 °С. При применении на крестоцветных рекомендуется добавлять в рабочий раствор суперсмачиватель Агент С, 50-100 мл/га.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Не рекомендуется применять в баковых смесях с агрохимикатами, повышающими pH рабочего раствора.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница	0,2	Злаковая тля, клопики, пьявицы, блошки, пшеничный трипс, клоп вредная черепашка	Опрыскивание в период вегетации. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га.
Кукуруза	0,32	Хлопковая совка	
	0,15	Кукурузный мотылёк	
Крестоцветные культуры	0,14-0,24	Рапсовый цветоед, крестоцветные блошки, клопы, белянки, тли	Опрыскивание в период развития личинок. Срок возможного пребывания людей на обработанных площадях не ранее 15 дней после обработки; сбор грибов и ягод после обработок дикой растительности в сезон обработки не допускается. Расход рабочей жидкости – 200-400 л/га.
Пастбища, участки, заселенные саранчовыми	0,1-0,15	Саранчовые	

Гербициды



Аврорекс, КЭ	76	Дикамерон, ВР.....	108
Аврора, МД ^{НОВИНКА}	78	Дифлайн, КЭ	110
Акцифор, КЭ.....	80	Зонатор, ВР	112
Алгоритм, КЭ	82	Кайман, ВР	114
Антарес, ВК	84	Кайман Форте, ВДГ	116
Аргамак, ВДГ.....	86	Клорит, ВР	118
Астэрикс, СЭ.....	88	Клетодим	
Ацифект, ВК.....	90	Плюс Микс, КЭ ^{НОВИНКА}	120
Бентасил, ВР	92	Ларт, ВР	122
Буцефал, КЭ	94	Метарон, ВДГ	124
Вымпел 2, КЭ.....	96	Тифи, ВДГ.....	126
Вымпел 3, КЭ.....	98	Флуорон, ВДГ	128
Галлон, КЭ.....	100	Фомесофт, ВК.....	130
Гримс, ВДГ.....	102	Формуляр, КЭ ^{НОВИНКА}	132
Диамисоль, ВР	106	Эндимион, КЭ	134

Аврорекс, КЭ

332 г/л 2,4-Д в виде эфира +
21 г/л карфентразон-этила

- Гарантированная эффективность против широкого спектра двудольных сорняков, в том числе подмаренника цепкого, осотов, ромашки, вьюнка, мари и других
- Высокая скорость воздействия на сорняки
- Эффективность при высоких температурах воздуха
- Безопасен для последующих культур севооборота

Смесевой гербицид для защиты зерновых и кукурузы от однолетних и многолетних двудольных сорняков



Канистра 5 л



Срок годности 2 года
от -20 до +40 °С

Механизм действия

Аврорекс обладает избирательным контактным и системным действием. Быстро проникает в растения и перемещается в точки роста. Чувствительные к 2,4-Д виды сорных растений повреждаются по типу гормонально-ингибиторной интоксикации; устойчивые к 2,4-Д (подмаренник цепкий, вероника и др.) – по механизму интоксикации карфентразон-этила, вследствие ингибирования фермента протопорфириноген-оксидаза. Это ведёт к блокировке синтеза хлорофилла и разрыву клеточных мембран.

Спектр действия

Подмаренник цепкий, бодяк (виды), осот (виды), падалица подсолнечника (включая устойчивые к имидазолинонам и Express Sun), молочай (виды), ромашка (виды), вьюнок полевой, марь белая, дымянка лекарственная, горец (виды), горчица полевая, редька дикая, амброзия полярнолистная, звездчатка средняя, вероника (виды), василёк синий, гулявник (виды), льнянка

обыкновенная, горцы (виды), липучка (виды), пикульник (виды), фиалка полевая, хвощ полевой, чистец однолетний.

Скорость действия

Симптомы действия препарата на чувствительные однолетние сорняки начинают проявляться через 14-18 часов, на многолетники – через 1-2 дня. Полное отмирание растений происходит в течение 3-7 дней и до 1 месяца, в зависимости от условий.

Возможность возникновения резистентности

Содержит действующие вещества с разными механизмами действия. Случаев резистентности не отмечено.

Рекомендации по применению

Обработку проводят весной в период активного роста сорняков, на посевах зерновых в фазе кущения, на кукурузе в фазе 3-5 листьев культуры.

Однолетние двудольные сорняки должны быть в фазе 2-4 настоящих листьев, многолетние в фазе розетки – 10 см. Опрыскивание Аврорексом рекомендуется проводить только вечером при температуре воздуха +8 ... +23 °С, (ночная температура не должна быть ниже +5 °С) и скорости ветра не более 3 м/с. В пасмурную погоду обработку можно проводить в течение всего дня. **ВНИМАНИЕ!** Не обрабатывать растения, мокрые от росы или дождя, а также если в течение 2 часов ожидается дождь. Не обрабатывать растения, находящиеся в состоянии стресса от воздействия абиотических и биотических факторов, за 3 дня до и после ночных заморозков.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	0,5 - 0,6	Однолетние двудольные, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х (подмаренник цепкий и др.) и некоторые многолетние двудольные корнеотпрысковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.
Кукуруза		Однолетние двудольные, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д (подмаренник цепкий и др.), и некоторые многолетние двудольные корнеотпрысковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.

Аврора, МД*

100 г/л мезотриона + 80 г/л амикарбазона + 60 г/л никосульфурона + 5 г/л аминопириалида

Послевсходовый гербицид для защиты посевов кукурузы против однолетних и многолетних широколистных сорняков



Канистра 10 л



Срок годности 2 года от -20 до +35 °С

- НОВИНКА!**
- Применяется в широком диапазоне сроков от 3-х до 6-ти листьев кукурузы
 - Контролирует широкий спектр сорняков
 - Не требует обязательного добавления ПАВов в рабочий раствор
 - Не фитотоксичен
 - Предотвращает развитие второй «волны» сорняков

Механизм действия

Мезотрион ингибирует фермент 4-гидрокси-фенилпируват диоксигеназы (HPPD), который является важным элементом цепочки синтеза каротиноидов. В растениях передвигается акропетально и базипетально, вызывая обесцвечивание точек роста с последующим увяданием.

Амикарбазон — ингибитор фотосинтетического транспорта электронов, вызывающий флуоресценцию хлорофилла и остановку выделения кислорода. Проникает в растения через листья и корни, вызывая хлороз, задержку роста и некрозы с последующим отмиранием растений.

Никосульфурон является ингибитором ацетолактатсинтазы (ALS), ключевого фермента синтеза незаменимых аминокислот (изолейцина, валина, лейцина).

Аминопириалид обладает ауксиноподобным системным действием. Проникает в растения через листья и корни, обладает продолжительной почвенной активностью.

Спектр действия

Канатник Теофраста, щирица запрокинутая, марь белая, яснотка пурпурная, росичка кроваво-красная, щавель кучерявый, крестовник обыкновенный, звездчатка средняя, падалица подсолнечника, устойчивая к имидазолинонам, горчак ползучий, паслен черный, щетинник, пырей ползучий, просо (виды), овсюг, плевел, горчица полевая, чистец болотный, редька полевая, горец почечуйный, дурман вонючий, сурепка обыкновенная, портулак огородный, пикульник.

Скорость действия

Видимые симптомы гербицидного действия на однолетние двудольные сорняки появляются на 3-5 день, на многолетние двудольные — от 10 до 14 дней, на злаковые сорняки — от 10 до 14 дней. Полное отмирание сорняков происходит в течение 1 месяца. Препарат обладает продолжительным почвенным действием, что предотвращает вторую «волну» сорняков.

Возможность возникновения резистентности

В состав Авроры включены действующие вещества, резко отличающихся механизмами действия. Возникновение резистентности маловероятно.

Рекомендации по применению

Перед применением препарата рекомендуется встряхнуть канистру. Обработку посевов кукурузы проводят в фазу 3-6 листьев культуры и в ранние фазы развития сорняков. На момент проведения обработки однолетние двудольные сорняки должны находиться в фазе 2-5 листьев, многолетние — в фазе розетки диаметром 10-15 см. При обработке важно ориентироваться на фазу развития сорняков. Опрыскивание Авророй рекомендуется проводить в утренние или вечерние часы при температуре воздуха от +8 до +23 °С (ночная температура не должна быть ниже +5 °С) и скорости ветра не более 3 м/с. В пасмурную погоду обработку можно проводить в течение всего дня.

ВНИМАНИЕ!!! Не обрабатывать растения, мокрые от росы или дождя, а также если в течение 2-х часов ожидается дождь.

Не обрабатывать растения, находящиеся в состоянии стресса от воздействия абиотических и биотических факторов.

Ограничения по севообороту

После применения препарата можно выращивать следующие культуры:

- через 1 месяц: зерновые, кукурузу, сорго
- осенью этого же года: озимые зерновые, озимый рапс, злаковые травы
- весной следующего года: яровые зерновые, яровой рапс, кукуруза, сорго
- через 11 месяцев при выпадении 300 мм осадков в виде дождя: подсолнечник, картофель, люцерну, лук, сахарную свеклу, лен-долгунец, капусту
- через 14 месяцев: чечевицу, нут (турецкий горох), сою, кормовые бобы, горох, морковь, хлопок.

При необходимости пересева обработанного участка можно высевать кукурузу и сорго.

Совместимость

Препарат совместим с большинством пестицидов и агрохимикатов, применяемыми в те же сроки. При этом в каждом конкретном случае рекомендуется проводить проверку на совместимость компонентов баковой смеси в малом объеме рабочего раствора.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Кукуруза на зерно	0,5 – 1,0	Однолетние и многолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га

Акцифор, КЭ

240 г/л оксифлуорфена

- Контроль широкого спектра двудольных сорняков
- Эффективно уничтожает такие злостные сорняки как марь, амброзию, дурнишник
- Обеспечивает чистые посевы благодаря почвенной активности и действию на вегетирующие сорняки
- Требуется всего 7 мм осадков после применения для контроля сорняков
- Высокотехнологичен, не требует заделки

Почвенный гербицид широкого спектра действия для защиты подсолнечника и лука



Канистра 1 л и 5 л



Срок годности 3 года
от 0 до +35 °С

Механизм действия

Акцифор образует на поверхности почвы гербицидный экран, подавляющий прорастание сорняков. При попадании препарата на вегетирующие сорняки он действует контактным способом, индуцирует разрушение клеточных мембран сорняков, что приводит к деформации клеток и усыханию тканей. Проростки двудольных сорняков из-за поражения подсемядольного колена отмирают практически мгновенно.

Спектр действия

Амброзия полыннолистная, канатник Теофраста, виды горцев, марь белая, горчица полевая, подмаренник цепкий, вьюнок полевой, щирца, яснотка.

Период защитного действия

Действие препарата на прорастающие сорняки сохраняется 3-4 недели.

Скорость действия

Визуальные признаки поражения отмечаются на 2-3 сутки после обработки, гибель растений наступает через 1-2 недели.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендацию по применению

Максимальный гербицидный эффект проявляется при равномерном нанесении препарата на сорняки и поверхность почвы. Почва должна быть тщательно выровнена, хорошо разделана и иметь мелкокомковатую структуру без растительных остатков. Высокий уровень контроля достигается при применении по увлажнённой почве и температуре воздуха выше +10° С, в чувствительные фазы сорняков: 1-2 пары настоящих листьев у двудольных.

Культурные растения не должны находиться в стрессовом состоянии. При обработке подсолнечника использование баковой смеси Акцифор 0,5 л/га + Дифилайн 1,0 л/га позволяет контролировать весь спектр однолетних сорняков.

При выращивании лука первую обработку препаратом (50-150 мл/га) рекомендуется начинать, когда лук сформирует 1-й настоящий лист. Дальнейшие обработки следует проводить с интервалом 6-10 дней с повышением дозировки препарата. Не проводить обработку, если в течение 3-4 часов после опрыскивания ожидаются осадки, в течение 2 дней после полива или если лук находится в состоянии стресса, так как все эти факторы нарушают восковой налёт, что может привести к фитотоксичности.

Целостность защитного экрана нельзя нарушать: штанга опрыскивателя должна находиться за трактором. Исключить культивацию или другие типы рыхления в течение не менее 2-3 недель после опрыскивания почвы.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения
Лук всех генераций (кроме лука на перо)	0,5	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-х листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.
	1,0		Опрыскивание посевов в фазе 3-х листьев культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.
Подсолнечник	0,8 - 1,0		Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.

Алгоритм, КЭ

480 г/л кломазона

Как почвенный гербицид

- Защищает обрабатываемые культуры в наиболее критический период развития
- Подавляет более 50 видов однолетних двудольных и злаковых сорняков
- Не имеет ограничений по севообороту
- Эффективно подавляет подмаренник цепкий
- Незаменимый компонент в баковых смесях с другими почвенными гербицидами, проявляет синергический эффект

Как гербицид по вегетации на сое

- Расширяет спектр подавляемых сорняков (марь белая, падалица подсолнечника в т.ч. Clearfield и Экспресс) в баковых смесях с препаратами на основе бентазона
- Почвенное действие позволяет сдерживать следующую волну сорняков и обеспечить чистое поле до уборки

Механизм действия

Препарат поступает в растения через корни, побеги, листья и блокирует синтез каротиноидов, что ведёт к разрушению хлорофилла и ингибированию процесса фотосинтеза.

Период защитного действия

Почвенное действие на прорастающие сорняки сохраняется более 30 дней.

Гербицид для борьбы с однолетними двудольными и некоторыми злаковыми сорняками в посевах сои, сахарной свеклы, рапса и моркови.



Канистра 1 л и 5 л,
кубтейнер 1000 л



Срок годности 3 года
от 0 до +30 °С

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Спектр действия

Высококучствительные виды: злаковые – куриное просо, росичка кровяная, мышей сизый, мышей зеленый, лисохвост, плевел; двудольные – марь белая, подмаренник цепкий, канатник Теофраста, паслен черный, гречишки, горчицы, амброзия полыннолистная, пастушья сумка, горчица полевая, гибискус, яснотка стеблеобъемлющая.

Скорость действия

При применении по вегетации симптомы поражения (хлоротичная окраска, побеление) проявляются на 3 день, полная гибель наступает через 10-14 дней в зависимости от видового состава, фазы развития сорняков и погодных условий. При использовании в качестве почвенного гербицида гибель сорняков наступает в момент прорастания.

Рекомендации по применению

Использование как почвенного гербицида.

Применять препарат рекомендуется в первые 3 дня после посева культуры. Заделка препарата в почву не требуется. Достаточная влажность почвы – одно из условий оптимального поглощения.

Применение смеси Алгоритм 0,4 л/га + Дифилайн 1,0 л/га на сое после посева позволяет сохранить чистое поле до следующей обработки, даже при очень высокой степени засорённости.

Если наблюдается недостаток почвенной влаги после применения гербицида, рекомендуется провести прикатывание.

Норма расхода препарата зависит от типа почвы, фазы развития и видового состава сорняков.

На почвах лёгкого механического состава, с невысоким содержанием гумуса рекомендуется использовать минимальные дозы. Максимальный гербицидный эффект достигается при хорошей выровненности поверхности поля, мелкокомковатой структуре почвы и отсутствию растительных остатков.

Использование смеси Алгоритм 0,12-0,15 л/га + Дифилайн 1,0 л/га на яровом рапсе – лучший способ борьбы с такими сорняками, как марь белая и виды щирицы. **Использование по вегетации.**

При использовании на сое по вегетации смеси Алгоритм 0,2-0,4 л/га + Бентасил 1,5-2,0 л/га достигается самая высокая эффективность против мари и амброзии.

Нежелательно использовать препарат в смеси с микроэлементами (медь, железо, цинк и т. д.).

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Не рекомендуется применять по вегетации сои в баковой смеси с препаратами на основе фомесафена в силу заметного снижения эффективности.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Соя	0,7 - 1	Однолетние двудольные и злаковые сорняки	Опрыскивание почвы до всходов культуры или посевов в фазе 3-х настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Свекла сахарная, морковь (кроме пучковой), рапс озимый и яровой	0,2		Опрыскивание почвы до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Антарес, ВК

500 г/л МЦПА

- Подавляет широкий спектр однолетних двудольных сорняков
- Прекрасный партнер в баковых смесях
- Не фитотоксичен
- Не накладывает ограничений на севооборот

Селективный системный гербицид для борьбы с двудольными сорняками в посевах льна, картофеля, гороха и других культур



Канистра 10 л



Срок годности 2 года
от -5 до +35 °С

Механизм действия

МЦПА в рекомендуемых дозах обладает разноплановым действием: поглощается листьями, действует на наземные органы и корневую систему сорняков, тормозит синтез ферментов и ростовых веществ, ослабляет процессы дыхания и фотосинтеза.

Спектр действия

Однолетние двудольные сорняки.

Период защитного действия

Обеспечивает защиту посевов от момента обработки до появления новой «волны» сорняков.

Скорость действия

Гербицид быстро проникает в листья сорняков, вызывая видимые признаки угнетения через 3-7 дней с момента обработки. Стебли и листья сорняков скручиваются и утолщаются, на стебле образуются трещины, рост растений нарушается. Полное отмирание сорняков происходит через 2-3 недели.

Возможность возникновения резистентности

Случаев возникновения резистентности сорняков к препарату не отмечено. Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Не рекомендуется обрабатывать культуру, испытывающую угнетение из-за неблагоприятных погодных или иных условий. При применении максимальных доз препарата на основе МЦПА на отдельных культурах (лен, картофель, горох) по вегетирующим растениям сразу после обработки могут появиться негативные проявления активности гербицида. На льне может наблюдаться снижение высоты растений и незначительное ухудшение качества льносоломы. Иногда возможно легкое подкручивание растений, пропадающее в скором времени.

Совместимость

Гербицид можно сочетать с сульфонилмочевинами и бромоксином для расширения спектра действия на двудольные сорняки. Также возможно смешивание с удобрениями, фунгицидами и инсектицидами при условии совпадения периодов внесения.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Горох на зерно	0,5 - 0,8	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 настоящих листьев культуры (при высоте растений гороха 10-15 см). Запрещается обрабатывать культуру во время цветения. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Сорго	0,7 - 1,2		Опрыскивание посевов в фазе 3-6 листьев культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Лён масличный	0,8 - 1		Опрыскивание посевов в фазе «елочки» при высоте культуры 3-10 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Лён-долгунец	0,8 - 1		
Картофель	1,2		Опрыскивание почвы до появления всходов или при высоте ботвы картофеля 10-15 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Аргамак, ВДГ

750 г/кг трибенурон-метила

- Не представляет опасности для последующих культур севооборота
- Широкий диапазон сроков применения вплоть до флагового листа
- Незаменимый компонент в баковых смесях с препаратами на основе 2,4-Д, дикамбы, карфентразон-этила

Высокоэффективный гербицид против более ста видов сорняков на зерновых, в т. ч. против сорных растений из семейства крестоцветные и сложноцветные



Пакет 100 г, банка 0,5 и 1 кг



Срок годности 2 года от -20 до +30 °С

Механизм действия

Препарат поглощается через листья, стебли и корни и перемещается к точкам роста. Трибенурон-метил блокирует в сорняках фермент ацетолактатсинтазу, которая участвует в синтезе аминокислот. Это приводит к остановке деления клеток и гибели сорных растений.

Спектр действия

Пастушья сумка, виды пикульника, виды пупавки, редька дикая, виды ромашки, торица полевая, щирица запрокинутая, ярутка полевая, виды яснотки и др.

Скорость действия

Остановка роста сорняков происходит через несколько часов после обработки. Через 5-7 дней заметны визуальные признаки поражения (хлороз листьев, отмирание точек роста, антоциановая окраска). Окончательная гибель сорняков происходит через 15-17 дней (срок зависит от видового состава и погодных условий).

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Препарат применяют для защиты озимых и яровых культур в фазу кущения-трубкавания в норме 15-20 г/га, а при наличии на поле бодяка полевого в норме 20-25 г/га. Оптимальная температура для применения Аргамака: от +8 до +25 °С. Обработку следует проводить по активно вегетирующим сорнякам. Сорняки, которые находятся в фазе от 2 до 8 настоящих листьев, наиболее чувствительны к действию препарата. При жаркой и сухой погоде, высокой численности сорняков, при наличии переросших сорняков рекомендуется добавлять суперсмачиватель Агент С в норме 0,05-0,1 % рабочего раствора.

Не применять препарат, если ночная температура ниже +5 °С, за 3 дня до заморозков и через 3 дня после них. Не применять в условиях, когда культура находится в стрессовом состоянии (по причине засухи, при сильном поражении болезнями и повреждении вредителями). Для расширения спектра подавляемых сорняков рекомендуется использовать баковые смеси с препаратами на основе 2,4-Д, дикамбы, карфентразон-этила.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, кг/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой и озимый	0,020-0,025	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х, и бодяк полевой	Наземное опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков (озимые культуры обрабатываются весной). Расход рабочей жидкости – 200 - 300 л/га.
Подсолнечник на семена (гибриды, устойчивые к трибенурон-метилу)	0,025-0,050	Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки	Наземное опрыскивание посевов в фазе от 2-4 до 6-8 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). В случае необходимости пересева высевать зерновые культуры. Расход рабочей жидкости – 200 - 300 л/га.

Астэрикс, СЭ

300 г/л 2,4-Д в виде эфира +
6,25 г/л флорасулама

- Высокоэффективен против широкого спектра двудольных сорняков
- Обладает высокой скоростью проникновения и гербицидного действия
- Может применяться в поздние фазы развития
- Не имеет последствия и ограничений по севообороту

Высокоэффективный гербицид против более ста видов сорняков на зерновых и кукурузе, в т. ч. против сорных растений из семейства крестоцветные и сложноцветные



Канистра 5 л



Срок годности 2 года
от -15 до +35 °С

Механизм действия

Действующие вещества обладают системной активностью, но резко различаются механизмом действия. Благодаря синергизму обеспечивается максимально высокий гербицидный эффект. 2,4-Д выступает в роли ауксиноподобного регулятора роста, в то время как флорасулам является ингибитором биосинтеза незаменимых аминокислот за счёт инактивации фермента ацеталактатсинтазы (ALS).

Спектр действия

Уничтожает более 150 видов сорных растений, в т. ч. подмаренник цепкий, виды ромашки, бодяк полевой, бодяк щетинистый, виды осота, виды вероники, вьюнок полевой, василек синий, горчицу полевую, пастушью сумку, ярутку полевую, виды яснотки, редьку дикую, марь белую, мак-самосейку, виды щирицы, желтушник левкойный, паслен черный, гулявник лекарственный, дымянку аптечную, звездчатку среднюю, виды горца, гречишку вьюнковую,

амброзию полыннолистную, дескурайнию Софии, латук татарский, одуванчик лекарственный, молочай лозный, молокан татарский и др.

Скорость действия

Визуальные признаки отмечаются через 3-4 дня, полная гибель — через 2-3 недели.

Возможность возникновения резистентности

Случаев резистентности не отмечено.

Рекомендации по применению

Наибольшая эффективность гербицида достигается при обработке в фазу 2-6 листьев у однолетних двудольных сорняков (высота 5-10 см), многолетних корнеотпрысковых – в фазу розетки – до начала стеблевания. Максимальную норму расхода следует использовать при высокой засоренности, по переросшим сорнякам и при наличии многолетних корнеотпрысковых сорняков. Оптимальная температура применения — от +12 до +25 °С. Обработку проводить во время активного роста сорняков.

Сорняки в фазе от 2 до 8 настоящих листьев наиболее чувствительны к действию препарата. **ВНИМАНИЕ!** Не применять препарат, если ночная температура ниже +10 °С, за 2 дня до заморозков и через 2 дня после них.

Не применять в условиях, когда культура находится в стрессовом состоянии (по причине засухи, при сильном поражении болезнями и повреждении вредителями).

Совместимость

Совместим с другими пестицидами кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница яровая и озимая, ячмень яровой	0,4 - 0,6	Однолетние, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и 2М-4Х и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
	0,6		Опрыскивание посевов в фазе выхода культуры в трубку (1-2 междоузлия) и ранние фазы роста сорняков (с учетом чувствительности сортов) в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили произвести обработку раньше срока. Озимые обрабатывают весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Кукуруза	0,4 - 0,6	Однолетние, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
	0,5 - 0,6		Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры в случае преобладания подмаренника цепкого; если погодные условия не позволили провести обработку раньше этого срока. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Ацифект, ВК

250 г/л ацифлуорфена

- Уничтожает трудноискоренимые сорняки в посевах сои, в том числе вьюнок
- Совместим с граминицидами, применяемыми в те же сроки
- Высокоселективен по отношению к сое

Контактный селективный гербицид для защиты сои



Канистра 5 л и 10 л



Срок годности 2 года от -5 до +35 °С

Механизм действия

Ацифект — контактный селективный гербицид, слабо перемещающийся по растению. Проникает в растения главным образом через листья. Высокая влажность воздуха, повышенная температура (20 - 25 °С) и хорошая освещенность способствуют более быстрому поглощению препарата растениями. Механизм действия ацифлуорфена основан на необратимом блокировании транспорта электронов, участвующих в процессе фотосинтеза. Как следствие этой реакции прерывается ассимиляция CO₂, останавливается рост, и растение погибает.

Скорость действия

Видимые признаки угнетения сорняков в зависимости от погодных условий проявляются через 3-7 дней после обработки гербицидом. Полная гибель сорняков — через 2 недели.

Спектр действия

Однолетние двудольные сорняки: горчица полевая, виды мари, ромашка (виды), дурнишник, гречишка вьюнковая, горцы (виды), щирица (виды), паслен черный, портулак (виды), амброзия (виды), подсолнечник сорно-полевой, конопля, подмаренник цепкий, гулявник струйчатый, молочай (виды), частуха обыкновенная, виды ясноток, пикульник обыкновенный, фиалка полевая.

Период защитного действия

Препарат действует только на сорняки, находившиеся в посевах в момент проведения обработки. На сорняки, взошедшие после проведения обработки (вторая «волна»), препарат не действует.

Последствие у препарата отсутствует.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Наиболее эффективна обработка в ранние фазы роста сорных растений (2-5 листьев). Сою целесообразно обрабатывать с фазы 1-го настоящего листа.

Совместимость

Совместим с препаратами на основе бентазона, а также граминицидами, применяемыми в те же сроки.

Ацифект 1,2-1,5 л/га с Бентасилом 1,2-1,5 л/га позволяет расширить спектр активности по переросшим сорнякам.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Соя	1 - 1,8	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-5 листьев). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Бентасил, ВР

480 г/л бентазона

- Широкий спектр действия против двудольных сорняков
- Может применяться на зерновых с подсевом бобовых трав
- Не фитотоксичен для культуры
- Не обладает последствием в севообороте
- Гибкие сроки применения на сое — от первого тройчатого листа до фазы бутонизации

Базовый гербицид для защиты бобовых и зерновых с подсевом трав



Канистра 20 л,
кубтейнер 1000 л



Срок годности 3 года
от -5 до +40 °С

Механизм действия

Механизм действия бентазона основан на необратимом блокировании транспорта электронов, участвующих в процессе фотосинтеза. Как следствие, прерывается ассимиляция CO_2 , останавливается рост, и растение погибает.

Скорость действия

Видимые признаки гербицидного воздействия проявляются в первую неделю после обработки. Полная гибель сорняков наступает в течение 10-14 дней.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Спектр действия

Высококочувствительные сорняки:

амброзия (виды), василёк синий, горчица полевая, виды мари, ромашка (виды), дурнишник, гре-

чишка вьюнковая, горец почечуйный, канатник Теофраста, пастушья сумка, подсолнечник (падалица), подмаренник цепкий, бодяк полевой, гулявник стручатый, частуха обыкновенная, виды портулака, виды клубнекамыша, сыть съедобная, щирица запрокинутая, ярутка полевая.

Среднечувствительные сорняки:

виды ясноток, пикульник обыкновенный, фиалка полевая.

Рекомендации по применению

Для достижения высокой эффективности опрыскивание должно обеспечить достаточное покрытие сорных растений рабочим раствором. В широкорядных посевах сои обработку следует проводить не позднее смыкания рядков. Холодная погода замедляет действие гербицида, оптимальная температура для применения от +15 до +25 °С.

На посевах сои при наличии трудноискоренимых сорняков (марь белая, амброзия полыннолистная) необходимо применять баковую смесь

Бентасил 1,5 - 2,0 л/га + Алгоритм 0,2 - 0,4 л/га. Эта смесь также показывает высокую эффективность против падалицы подсолнечника, включая гибриды, устойчивые к имидазолинонам и Express Sun.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница яровая и озимая, рожь, ячмень, овес	2 - 4	Однолетние двудольные сорняки, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА	Опрыскивание посевов весной с начала кущения зерновых культур в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.
Яровые зерновые с подсевом клевера			Опрыскивание посевов после развития 1-го тройчатого листа у клевера (в фазе кущения зерновых). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.
Пшеница, ячмень, овес яровые с подсевом люцерны	2		Опрыскивание посевов после развития 1-2 настоящих листьев люцерны (в фазе кущения зерновых). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га
Горох на зерно	2 - 3	Однолетние двудольные сорняки, в т. ч. устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов в фазе 5-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Принимать во внимание сортовую чувствительность. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га
Лен-долгунец	3 - 4		Опрыскивание посевов в фазе «елочки» культуры в ранние фазы роста сорняков (3-5 листьев). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.
Соя	1,5 - 3	Однолетние двудольные сорняки, в т. ч. дурнишник обыкновенный	Опрыскивание посевов, начиная с фазы 1-го настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа). Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.

Буцефал, КЭ

480 г/л карфентразон-этила

- Подавляет широкий спектр двудольных сорняков
- Уничтожает злостные сорняки, в т. ч. подмаренник цепкий и вьюнок полевой
- Наиболее эффективен в солнечные дни
- Низкая норма расхода — от 25 до 30 мл
- Отличный партнер с 2,4-Д, дикамбой и трибенурон-метилом в баковых смесях
- Не имеет ограничений по применению в севообороте

Контактный гербицид с широким окном применения на зерновых



Канистра 5 л



Срок годности 2 года
от -15 до +35 °С

Механизм действия

Карфентразон-этил обладает контактным действием. В растениях ингибирует протопорфириногенаксидазу клеточных ферментов (ингибитор клеточных ферментов), что ведет к остановке фотосинтеза и разрушению клеточных мембран.

Спектр действия

Паслен черный, подмаренник цепкий, щирица, марь белая, вьюнок полевой, канатник Теофраста, пастушья сумка, горчица полевая, яснотка, амброзия полыннолистная, вероника, фиалка полевая и др., устойчивые к 2,4-Д. При высоких дозах повреждаются некоторые многолетние двудольные сорняки, например, щавель конский и бодяк полевой.

Скорость действия

Визуальные признаки действия препарата отмечаются на 4-е сутки после опрыскивания. Полное отмирание сорняков происходит в течение 1 месяца.

Период защитного действия

Препарат действует только на сорняки, находившиеся в посевах в момент проведения опрыскивания.

На сорняки, взошедшие после проведения обработки, препарат не действует.

Рекомендации по применению

Обработку проводят в фазу кущения зерновых и ранние фазы развития сорняков. Препарат эффективно подавляет подмаренник цепкий на стадиях до 8-ми мутовок, в течение 3-4-х дней высушивает надземную массу вьюнка полевого. При интенсивной солнечной инсоляции после применения Буцефала возможно появление некротичных пятен на культуре, которые не влияют на протекание фаз развития и конечный урожай.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов со сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница яровая и озимая	0,025 - 0,03	Однолетние двудольные, в т. ч. подмаренник цепкий и другие устойчивые к 2,4- Д сорняки.	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Озимые обрабатывать весной. Расход рабочей жидкости 200- 400 л/га.

Вымпел 2, КЭ

160 г/л фенмедифама +
160 г/л десмедифама

- Послевсходовый гербицид для борьбы с двудольными сорняками на сахарной и кормовой свекле
- Широкий спектр действия, включая виды щирицы
- Гибкие нормы применения
- Проявляет быстрый гербицидный эффект
- Базовый гербицид для защиты свеклы

Послевсходовый гербицид для борьбы с двудольными сорняками на сахарной и кормовой свекле



Канистра 5 л



Срок годности 2 года
от -15 до +35 °С

Механизм действия

Препарат проникает через листья и распределяется по всему растению. Действующие вещества ингибируют фотосинтез, влияют на усвоение растениями углекислоты, угнетают процессы фосфорилирования, приводящие к нарушению энергетического баланса и обменных реакций.

Спектр действия

Амброзия полыннолистная, горчица полевая, лебеда раскидистая, гречишка вьюнковая, звездчатка средняя, незабудка полевая, пастушья сумка, пикульник (виды), портулак огородный, редька дикая, торица полевая, щирица (виды), ярутка полевая, яснотки. Умеренно чувствительные к препарату виды: василек синий, вероника (виды), горец (виды), дескурайния Софии, дурнишник обыкновенный, дымянка лекарственная, канатник Теофраста, мак-самосейка, молочай, паслен черный, полынь обыкновенная, фиалка полевая.

Рекомендации по применению

Вымпел 2 эффективен на ранних стадиях развития сорняков. Рекомендуются следующие нормы расхода:

- сорняки в стадии семядолей — 1,0 л/га
- сорняки в стадии первой пары настоящих листьев — 1,25 л/га
- сорняки в стадии второй пары настоящих листьев — 1,5 л/га.

Обработки повышенными дозировками препарата (до 3 л/га) возможны по переросшим сорнякам, при условии, что культура находится в стадии 4-х настоящих листьев.

Для расширения спектра действия возможно применение с другими гербицидами: граминицидами (Галлон) и противоосотовыми (Клорит), а также с Флуороном и Метароном. Обработки посевов рекомендуется проводить в вечернее время, начиная с заката до конца светового дня при температуре воздуха не больше +25 °С.

Это позволит избежать проявления фитотоксичности, активируемой солнечной радиацией. Расход рабочего раствора – 200 л/га. При приготовлении баковых смесей следует соблюдать очередность растворения препаративных форм в баке опрыскивателя: ВДГ- КЭ- ВР.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Свекла сахарная, свекла кормовая	3	Однолетние двудольные, в т. ч. щирица	Опрыскивание посевов в фазе 4-х настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Свекла сахарная, свекла кормовая	1,5		Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Свекла сахарная, свекла кормовая	1		Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне сорных растений). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Вымпел 3, КЭ

91 г/л фенмедифама + 71 г/л десмедифама + 112 г/л этофумезата

- Базовый гербицид для 1-ой обработки свеклы
- Контролирует широкий спектр сорняков, в т. ч. щирицу
- Высокая селективность для культуры
- Проявляет быстрый гербицидный эффект
- Является основной для приготовления баковых смесей

Базовый гербицид для первой обработки свеклы



Канистра 5 л



Срок годности 2 года
от -15 до +35 °С

Механизм действия

Фенмедифам и десмедифам, проникая через листья, ингибируют фотосинтез, влияют на усвоение растениями углекислоты, угнетают процессы фосфорилирования, приводящие к нарушению энергетического баланса и обменных реакций. Этофумезат проникает через корни и листья, обладает системным действием, нарушает митоз в клетках сорного растения.

Скорость действия

Рост сорняков прекращается в первые сутки после обработки. Симптомы применения препарата проявляются на 3-4 день.

Возможность возникновения резистентности

Содержит действующие вещества с разными механизмами действия. Случаев резистентности не отмечено.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией.

Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Спектр действия

Амброзия полыннолистная, горчица полевая, лебеда раскидистая, гречишка вьюнковая, звездчатка средняя, куриное просо, мятлик обыкновенный, незабудка полевая, пастушья сумка, пикульник (виды), портулак огородный, редька дикая, торица полевая, щирица (виды), ярутка полевая, яснотки. Умеренно чувствительные к препарату виды: василек синий, вероника (виды), горец (виды), гумай, дескурайния Софии, дурнишник обыкновенный, дымянка лекарственная, канатник Теофраста, мак самосейка, метлица обыкновенная, молочай, овсюг, паслен черный, полынь обыкновенная, росички, щетинники, фиалка полевая.

Рекомендации по применению

Вымпел 3 эффективен на ранних стадиях развития сорняков. Рекомендуются следующие нормы расхода:

- сорняки в стадии семядолей — 1,0 л/га
- сорняки в стадии первой пары настоящих листьев — 1,25 л/га
- сорняки в стадии второй пары настоящих листьев — 1,5 л/га.

Возможны обработки повышенными дозировками препарата (до 3 л/га) по переросшим сорнякам при условии, что культура находится в стадии 4-х настоящих листьев. Вымпел 3 совместим в баковых смесях с другими гербицидами, применяемыми в те же сроки: противозлаковыми (Галлон), противоосотовыми (Клорит), а также с Флуороном и Метароном.

Обработки посевов рекомендуется проводить в вечернее время, начиная с заката до конца светового дня, при температуре воздуха не больше +25 °С. Это снижает риск проявления фитотоксичности, активируемой солнечной радиацией.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ, время обработки, особенности применения
Свёкла сахарная и кормовая	3	Однолетние двудольные, в т.ч. щирица, и некоторые однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 4-х настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.
	1,5		Опрыскивание посевов в фазе 2-4 листьев сорняков (по первой и второй волне). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.
	1		Опрыскивание посевов в фазе семядолей сорняков (по первой, второй и третьей волне сорных растений). Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.

Галлон, КЭ

104 г/л галоксифоп-Р-метила

- Подавляет однолетние и многолетние злаковые сорняки
- Полностью уничтожает корневища пырея ползучего
- Обладает системным действием, быстро поглощается листьями сорняков и переносится к точкам роста, корням и корневищам
- Селективен по отношению к обрабатываемым культурам
- Высокоэффективен при малых нормах расхода
- Универсальный партнёр в баковых смесях с противодвудольными гербицидами

Гербицид для эффективного подавления корневищных злаковых сорняков



Канистра 5 л



Срок годности 3 года
от -15 до +35 °С

Механизм действия

Препарат поглощается наземными органами растения в течение 1–3 ч после применения и накапливается в точках роста. На биохимическом уровне гербицид ингибирует биосинтез жирных кислот в меристемных тканях злаковых сорняков, что препятствует образованию клеточных мембран. В результате точка роста отмирает, что ведёт к прекращению роста и гибели сорняков.

Спектр действия

Эффективен против однолетних и многолетних злаковых сорняков: просо куриное, просо волосовидное, щетинник (виды), овсюг, метлица обыкновенная, лисохвост полевой, мятлик однолетний, росичка кроваво-красная, пырей ползучий, свинорой пальчатый, сорго алеппское (гумай) и др.

Скорость действия

Симптомы действия гербицида (хлороз, антоциановая окраска, отмирание точек роста) проявляются через 5–7 дней.

Полная гибель сорняков наступает в течение 2–3 недель в зависимости от вида сорняков и погодных условий.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Однолетние злаковые сорняки опрыскивают в период их активного роста (в фазе от 2–4 листьев до кущения), многолетние злаковые при их высоте 10–15 см. Сроки обработки не зависят от стадии развития культуры.

Однако культурные растения не должны экранировать собой сорняки.

Оптимальная температура обработки +15 °С ... 25 °С. Не применять препарат, если ночная температура ниже +5 °С, за 3 дня до заморозков и через 3 дня после них.

Не применять в условиях, когда культура находится в стрессовом состоянии (по причине засухи, при сильном поражении болезнями и повреждении вредителями).

Не рекомендуется применять в составе баковых смесей с противодвудольными препаратами.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Условия хранения и срок годности

Препарат следует хранить в складах, специально предназначенных для пестицидов, в герметично закрытой без повреждений заводской таре.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, соя, рапс яровой	0,5	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное, просо сорное)	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2–6 листьев до кущения). Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га.
Свекла сахарная и кормовая, подсолнечник, рапс яровой, соя	1	Многолетние злаковые сорняки (пырей ползучий)	Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10–15 см. Расход рабочей жидкости – 200–300 л/га.

Гримс, ВДГ

250 г/кг римсульфурана

- Контролирует однолетние и некоторые многолетние злаковые и двудольные сорняки
- Широкое окно применения: фаза культуры – от 2 до 6 листьев
- Отсутствие ограничений в севообороте
- Отличный партнер для баковых смесей

Базовый гербицид для защиты кукурузы и картофеля



Банка 100 г



Срок годности 3 года
от -20 до +30 °C

Механизм действия

Гримс поглощается преимущественно листьями сорняков и быстро перемещается к меристемным тканям корневой системы и побега. Блокирует фермент ацетолататсинтазу, которая участвует в синтезе аминокислот, что ведёт к остановке деления клеток сорняков, прекращению их роста и гибели.

Спектр действия

Злаковые: лисохвост, овсюг, плевел (виды), просо волосовидное (2 листа), просо куриное, тимофеевка (виды), щетинник (виды), пырей ползучий, сорго алеппское (гумай). **Двудольные:** амброзия (виды), бодяк (виды), осот полевой, вика посевная, дурнишник (виды), дымянка лекарственная, пастушья сумка, подмаренник цепкий, ромашка (виды), канатник Теофраста, крестовник (виды), мак-самосейка, паслен черный, марь (виды), молочай (виды), звездчатка средняя, щирица (виды), ярутка полевая.

Скорость действия

Остановка роста сорняков происходит через несколько часов после обработки, сорняки перестают конкурировать с культурными растениями. Через 5 - 7 дней заметны визуальные признаки поражения (хлороз листьев, отмирание точек роста, антоциановая окраска). Окончательная гибель сорняков происходит через 15 - 17 дней (срок зависит от видового состава и погодных условий).

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Гримс применяется только с адьювантом Альф, Ж, который улучшает проникновение действующего вещества в сорное растение.

Рекомендуемая концентрация Альф, Ж в рабочем растворе 0,1 % (100 мл на 100 л рабочего раствора). В условиях засухи норму применения рабочего раствора следует увеличивать до 300 л/га с соответствующим увеличением дозировки Альф, Ж до 300 мл/га. Гримс обладает системным действием на сорные растения, но не имеет значительной почвенной активности, таким образом, контролируются только те сорняки, которые проросли на момент обработки.

Наиболее уязвимая фаза развития сорняков:

- однолетних двудольных: семядоли — 4 настоящих листа
- многолетних корнеотпрысковых (бодяк, осот): розетка листьев (10 - 15 см в диаметре)
- вьюнка полевого: плеть длиной 10 - 15 см.

Как и большинство сульфонилмочевин, Гримс работает уже при температурах от +5 °C, но оптимальной температурой можно считать диапазон от +15 до +24 °C. Также важно отсутствие осадков в течение 2-х часов после обработки. При работе по переросшим сорнякам рекомендуется применение максимальных дозировок. Так как Гримс обеспечивает контроль, в основном, злаковых сорняков, при смешанном засорении на кукурузе рекомендуется применение баковых смесей с противодвудольными гербицидами Ларт и Астэрикс.

Опрыскивание проводится в фазе 2 - 6 листьев кукурузы и 15 - 20 см всходов картофеля или сразу после окучевания в дозировке 50 г/га. Снижение дозировки до 40 г/га возможно при отсутствии в посевах многолетних и переросших однолетних сорняков при благоприятных погодных условиях.

Дробное применение Гримс оправдано при неравномерных всходах сорняков и предполагает 2 обработки.


Первая обработка проводится в фазе до 3-х листьев злаковых и не более 4-х листьев двудольных сорняков в дозировке 30 г/га.

Вторая обработка проводится по новой «волне» сорняков с нормой расхода 20 г/га. При проведении второй обработки следует соблюдать ограничение по высоте картофеля, которая не должна превышать 20 см.

Совместимость

Гримс нельзя применять в смеси с фосфорорганическими инсектицидами, а также за 14 дней до и после их применения. Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, кг/га	Вредный объект	Способ применения
Кукуруза (на зерно)	0,04	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с Альф, Ж. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
	0,05	Многолетние и однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры при высоте злаковых сорняков 10-15 см и в фазе розетки осотов в смеси с Альф, Ж 200 мл/га. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
	0,03 + 0,02		Опрыскивание посевов в фазе 2-6 листьев культуры. Двукратное дробное опрыскивание по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с Альф, Ж 200 мл/га. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Картофель	0,05	Многолетние (пырей), однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окучивания в ранние фазы развития (1-4 листа) однолетних сорняков и при высоте пырея 10-15 см в смеси с Альф, Ж 200 мл/га. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
	0,03 + 0,02	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посадок после окучивания по первой и второй волне сорняков (интервал 10-20 дней) в смеси с Альф, Ж 200 мл/га. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.



NectaScout
Задайте вопрос агроному!

ДОСТУПНО В
Google Play

Загрузите в
App Store

**Справочник
пестицидов
и агрохимикатов
в вашем смартфоне!**



Диамисоль, ВР

600 г/л 2,4-Д в виде диметиламинной соли

- Обладает высокой избирательностью к обрабатываемым культурам
- Широкий спектр контролируемых сорняков
- Прекрасный компонент для приготовления баковых смесей в системе комплексной защиты зерновых культур

Гербицид широкого спектра действия для защиты зерновых



Канистра 5 л и 20 л.



Срок годности 2 года от 0 до +35 °С

Механизм действия

Гербицид быстро поглощается листьями и распределяется по всему растению, достигая точек роста. Механизм действия ауксинового типа. Подавление роста сорных растений происходит через несколько часов после обработки.

Спектр действия

Однолетние двудольные сорняки.

- Чувствительные виды: вика сорнополевая, горчица полевая, мак самосейка, марь (виды), незабудка полевая, одуванчик (виды), пастушья сумка, редька дикая.
- Умеренно чувствительные виды: амброзия полыннолистная, василек синий, вероника (виды), дурнишник обыкновенный, канатник Теофраста, лебеда раскидистая, осот (виды), щирица (виды), ярутка полевая, яснотки.

Скорость действия

Признаки увядания сорных растений (деформация, скручивание, утолщение стеблей и листьев) наблюдаются на 4 - 5 день, хлороз, отмирание точки роста и затем гибель сорняков – через 10 -15 дней.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Наибольшая эффективность гербицида достигается при обработке в фазу 2-6 листьев у однолетних двудольных сорняков (высота 5-10 см), многолетних корнеотпрысковых – в фазу розетки – до начала стеблевания.

Максимальную норму расхода следует использовать при высокой засоренности, по переросшим сорнякам и при наличии многолетних корнеотпрысковых сорняков. Оптимальная температура для применения препарата от +12 до +25 °С.

Не применять препарат, если ночные температуры ниже +5 °С, за 2 дня до и после заморозков. Не применять в условиях, когда культура находится в стрессовом состоянии (по причине засухи, при сильном поражении болезнями и повреждении вредителями).

Для расширения спектра подавляемых сорняков рекомендуется применять баковые смеси с препаратами на основе дикамбы (Ларт), трибенурон-метила (Аргамак), карфентразон-этила (Буцефал).

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница озимая и яровая, ячмень яровой	1 - 1,6	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры до выхода в трубку. Озимые обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Гречиха	1 - 1,3		Опрыскивание посевов за 2-3 дня до всходов культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Дикамерон, ВР

267 г/л клопиралида + 67 г/л пиклорама

- Послевсходовый гербицид для контроля однолетних и многолетних двудольных сорняков в посевах рапса
- Высокая селективность к культуре
- Контролирует «проблемные» сорняки в посевах рапса, в т. ч. подмаренник цепкий
- Широкий диапазон сроков применения

Послевсходовый гербицид для контроля однолетних и многолетних двудольных сорняков в посевах рапса



Канистра 10 л



Срок годности 3 года
от -20 до +30 °С

Механизм действия

Дикамерон обладает системным действием. Сходство клопиралида и пиклорама с ростовыми гормонами позволяет Дикамерону активно поглощаться листьями и перемещаться к точкам роста, в том числе и в корни. Оба действующих вещества замещают и блокируют функции натуральных гормонов, что ведет к остановке роста и гибели растений.

Спектр действия

- Высокочувствительные: амброзия полынолистная, бодяк полевой, горец почечуйный, василек синий, дымянка аптечная, молокан татарский, осот (виды), паслен черный, подмаренник цепкий, ромашка (виды).
- Среднечувствительные: мак самосейка, галинсога мелкоцветная, звездчатка средняя, гречишка татарская, фиалка полевая, щирица запрокинутая, яснотка (виды).
- На злаковые и крестоцветные сорняки Дикамерон не действует!

Скорость действия

Остановка роста чувствительных сорняков происходит в первые 2 часа после обработки. Визуальные симптомы гербицидного действия проявляются через 7-10 дней. Полная гибель сорняков наступает в течение 2-3 недель.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Дикамерон высокоселективный гербицид в отношении озимого и ярового рапса, может применяться в широком диапазоне сроков, начиная от фазы 3-х настоящих листьев до появления первых бутонов, диаметр которых не должен превышать 1 см. Максимальный эффект от применения Дикамерона достигается при применении по массовым всходам активно вегетирующих сорняков.

Многолетние сорняки наиболее чувствительны к Дикамерону в фазу розетки листьев диаметром 10-15 см.

Дикамерон подавляет подмаренник цепкий на стадиях до 8-ми мутовок. На более поздних стадиях роста сорняка происходит его остановка роста, что позволяет задержать его развитие до фазы активного роста рапса, после чего сорняк уже не способен конкурировать с культурой.

Совместимость

Препарат совместим с противозлаковыми гербицидами, инсектицидами, фунгицидами, регуляторами роста растений, жидкими удобрениями. Перед приготовлением рабочего раствора в смеси с другими препаратами рекомендуется провести проверку на совместимость в малой емкости.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Рапс яровой и озимый	0,3 – 0,35	Однолетние и многолетние двудольные сорные растения, в том числе подмаренник цепкий, виды ромашки, горца, щирицы, мари, гречишка вьюнковая, виды бодяка и осота	Опрыскивание вегетирующих растений весной с фазы 3 – 6 настоящих листьев до появления цветочных бутонов у рапса. Обработка озимого рапса – весной. Расход рабочей жидкости – 200 - 300 л/га

Дифлайн, КЭ

960 г/л С-метолахлора

- Довсходовый гербицид для защиты сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, сои и рапса
- Высокоэффективен против широкого спектра однолетних злаковых и двудольных сорняков
- Устраняет конкуренцию с сорными растениями в начальный период роста
- Не оказывает фитотоксичного воздействия на культуру и не имеет последствий
- Обеспечивает продолжительный период защитного действия от 8 до 10 недель

Довсходовый гербицид для защиты сахарной свеклы, подсолнечника, кукурузы, сои и рапса



Канистра 5 л, 20 л,
кубтейнер 1000 л



Срок годности 3 года
от -15 до +35 °С

Механизм действия

Гербицид Дифлайн блокирует процесс деления клеток, что ведёт к прекращению отрастания и гибели сорняков. В злаковых сорняках С-метолахлор проникает в coleoptyl, в процессе чего росток скручивается и гибнет. В двудольных действующее вещество проникает в семядоли и вызывает их гибель.

Спектр действия

Куриное просо, просо волосовидное, щетинник (виды), росичка (виды), гумай (проростки), щирица (виды), звездчатка средняя, пастушья сумка, портулак огородный, ромашка (виды), галинсога (виды), яснотка (виды) и многие другие.

Скорость действия

Препарат контролирует сорняки в момент прорастания.

Период защитного действия

Почвенное действие препарата на прорастающие сорняки сохраняется 8 - 10 недель.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Применять препарат рекомендуется в течение первых трёх дней после посева культуры. Достаточная увлажненность почвы — одно из условий оптимального поглощения. Если наблюдается недостаток почвенной влаги, после применения гербицида рекомендуется провести прикатывание почвы. При сухой почве рекомендуется проведение опрыскивания гербицидом перед высевом семян и лёгкая заделка на глубину 2 - 3 см. Норма расхода препарата зависит от типа почвы, уровня и видового состава сорняков. На почвах лёгкого механического состава, с невысоким содержанием гумуса рекомендуется использовать минимальные дозы.

Максимальный гербицидный эффект достигается при хорошей выровненности поверхности поля, мелкокомковатой структуре почвы и отсутствию растительных остатков. Для расширения спектра действия рекомендуется баковая смесь с гербицидом Алгоритм.

На рапсе при наличии мари белой, амброзии и подмаренника цепкого: Дифлайн 1,0 л/га + Алгоритм 0,12 - 0,15 л/га. На сое при наличии мари белой и амброзии: Дифлайн 1,0 л/га + Алгоритм 0,2 - 0,4 л/га.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Кукуруза, соя, подсолнечник, рапс яровой	1,3 - 1,6	Однолетние злаковые и некоторые двудольные сорняки	Опрыскивание почвы до посева или до всходов культуры. В засушливых условиях рекомендуется мелкая заделка препарата (на глубину не более 5 см). Расход рабочей жидкости – 200 – 400 л/га.
Свёкла сахарная	1,3 - 2		

Зонатор, ВР

40 г/л имазамокса

- Подавляет широкий спектр однолетних злаковых и двудольных сорняков
- Тормозит рост и развитие многолетних видов сорняков (в т. ч. осота и пырея)
- Проникает в сорняки как через листья, так и через корни
- Сдерживает следующую волну сорняков за счёт остаточного почвенного действия

Послевсходовый гербицид широкого спектра действия для защиты сои и устойчивых к имидазолинонам сортов и гибридов подсолнечника, а также сортов ярового рапса



Канистра 5 л



Срок годности 3 года
от -5 до +30 °С

Механизм действия

Имазамокс проникает в растения через надземные органы и корни, хорошо передвигается по флоэме и ксилеме и накапливается в меристемных тканях. Поглощение через корневую систему зависит от влажности почвы. Имазамокс подавляет биосинтез валина и изолейцина в растении через ингибирование фермента ацетолактатсинтазы. В результате в зонах роста сорняков прекращается деление клеток, что приводит к отмиранию растений.

Спектр действия

Чувствительные виды: однолетние злаковые и двудольные и некоторые многолетние сорняки, в том числе: амброзия полыннолистная, марь белая, горчица полевая, овсюг полевой, дурнишник (виды), осот желтый, дымянка лекарственная, просо куриное, канатник Теофраста, щетинник (виды), щирица (виды) и др. **Средне чувствительные виды:** полынь (виды), осот розовый, пырей ползучий и др.

Скорость действия

Первые признаки повреждений наблюдаются через 5-7 дней. Полная гибель сорняков наступает через 10-15 дней после обработки.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Оптимальное время обработки сои — появление пары примордиальных листьев, ориентируясь на фазу развития сорняков (всходы, 2-4 настоящих листа). В течение 2-4 недель не заделывать и не проводить междурядных культиваций, чтобы не нарушать гербицидный экран. Для уничтожения трудноискоренимых сорняков (дурнишник, канатник, амброзия) на сое и горохе рекомендуется обработка баковой смесью с гербицидом Бентасил. Холодная погода замедляет действие гербицида, оптимальная температура для применения от +15 °С до +25 °С.

При соблюдении регламентов применения не оказывает отрицательного действия на культуру сои и гороха. К нему устойчивы также сорта и гибриды подсолнечника и рапса ярового, устойчивые к имидазолинонам. Имазамокс может оказывать отрицательное последствие на чувствительные культуры севооборота, такие как зерновые, сахарная свекла, подсолнечник и кукуруза.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Соя	0,75	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков и 1-3 настоящих листьев культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса обычных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы и рапса – 16 месяцев). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Горох (при выращивании на зерно)			
Рапс яровой (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам)	0,8 - 1,1		Опрыскивание вегетирующих растений в фазу 2-6 листьев у культуры и ранние фазы роста сорняков. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса обычных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы и рапса – 16 месяцев). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Подсолнечник (сорта и гибриды, устойчивые к имидазолинонам) на семена и масло			
			Опрыскивание посевов в ранние фазы роста сорняков (2-4 листа) и 4-5 настоящих листьев культуры. На следующий год можно высевать все культуры, кроме сахарной свеклы и рапса обычных сортов (безопасный интервал между применением гербицида и посевом свеклы и рапса – 16 месяцев). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Кайман, ВР

360 г/л глифосата кислоты
(изопропиламинная соль)

- Гербицид сплошного действия
- Решает проблему борьбы с пыреем ползучим и другими многолетними сорняками
- Незаменим при разработке залежных земель.
- Облегчает борьбу с сорняками в парах
- Не обладает последствием на культуры севооборота

Гербицид сплошного действия



Канистра 20 л,
кубейтеры 1000 л и 20000 л



Срок годности 2 года
от -15 до +40 °С

Механизм действия

Проникает через листья и другие зелёные части растения, переносится к точкам роста, в т. ч. и корневым. Блокирует синтез ароматических аминокислот, что ведёт к отмиранию точек роста и гибели растения.

Спектр действия

Гербицид общего истребительного действия, уничтожающий практически все сорняки как однолетние, так и многолетние, как злаковые, так и двудольные.

Скорость действия

Через 2-5 дней видны признаки поражения однолетних сорняков (побурение, пожелтение растений, усыхание листьев). Через 5-7 дней видны признаки поражения многолетних сорняков. Через 3-4 недели - полная гибель сорняков (в зависимости от вида и погодных условий).

Рекомендации по применению

Максимальная эффективность достигается по активно вегетирующим сорнякам в условиях достаточного увлажнения и температурах выше +10 °С.

Наиболее уязвимые фазы сорняков:

- многолетние злаковые — 4-5 листьев, 10-20 см высотой
- многолетние двудольные — фаза цветения до начала старения
- однолетние злаковые и двудольные — когда лист злаковых длиной 5 см, а двудольные — 2 настоящих листа.

Норма расхода препарата зависит от видового состава сорняков и фазы их развития и колеблется от 2-8 л/га.

При смешанном типе засорённости однолетними и многолетними сорняками для усиления эффективности рекомендуются следующие баковые смеси: Кайман 2,5 л/га + Ларт 0,2 л/га; Кайман 2,5 л/га + Диамисоль 0,4 л/га.

Для улучшения качества покрытия растений и усиления проникновения действующих веществ рекомендуется добавление в рабочий раствор Агента С в норме 50-100 мл на 1 га.

Совместимость

Совместим с гербицидами на основе 2,4-Д и дикамбы, применяемыми в те же сроки.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Поля, предназначенные под посев различных культур (яровые зерновые, овощные, картофель, технические, масличные, бахчевые, а также семенные посевы однолетних цветочных)	2 - 4	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послеуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га.
	4 - 6	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	
	6 - 8	Злостные многолетние (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки	
Пары	2 - 4	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га.
	4 - 6	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	
	6 - 8	Злостные многолетние (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки	
Земли не с/х назначения	3 - 4	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га. Запрещается сбор ягод и грибов в период проведения обработки.
	4 - 6	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	

Кайман Форте, ВДГ

687 г/кг глифосата кислоты
(изопропиламинная соль)

- Новая современная препаративная форма
- Увеличенное содержание действующего вещества
- Низкие нормы расхода препарата
- Удобен в транспортировке, хранении и использовании
- Высокая биологическая и экономическая эффективность препарата

Гербицид сплошного действия,
уничтожающий практически все
сорняки на обрабатываемом участке.
С повышенным содержанием
действующего вещества



Пакеты 1 кг, 5 кг, 10 кг,
мягкие контейнеры 500 кг, 1000 кг



Срок годности 3 года
от -15 до +40 °С

Механизм действия

Проникает через листья и другие зелёные части растения, переносится к точкам роста, в т. ч. и корневым. Блокирует синтез ароматических аминокислот, что ведёт к отмиранию точек роста и гибели растения.

Спектр действия

Гербицид общего истребительного действия, уничтожающий практически все сорняки — как однолетние, так и многолетние, как злаковые, так и двудольные.

Скорость действия

Через 2-5 дней видны признаки поражения однолетних сорняков (побурение, пожелтение растений, усыхание листьев). Через 5-7 дней видны признаки поражения многолетних сорняков. Через 3-4 недели — полная гибель сорняков (в зависимости от вида и погодных условий).

Рекомендации по применению

Максимальная эффективность достигается по активно вегетирующим сорнякам в условиях достаточного увлажнения и температурах выше +10 °С. Наиболее уязвимые фазы сорняков:

- многолетние злаковые — 4-5 листьев, 10-20 см высотой
- многолетние двудольные — фаза цветения до начала старения
- однолетние злаковые и двудольные — когда лист злаковых длиной 5 см, а двудольные — 2 настоящих листа.

Норма расхода препарата зависит от видового состава сорняков и фазы их развития и колеблется от 1 до 4 кг/га.

При смешанном типе засорённости однолетними и многолетними сорняками для усиления эффективности рекомендуются следующие баковые смеси:

- Кайман Форте 1,5 кг/га + Ларт 0,2 л/га
- Кайман Форте 1,5 кг/га + Диамисоль 0,4 л/га.

Совместимость

Совместим с гербицидами на основе 2,4-Д и диамфамбы, применяемыми в те же сроки.

Рекомендуется применять препарат совместно с ПАВ Альф, Ж.

Культура	Норма расхода, кг/га	Вредный объект	Способ применения
Поля, предназначенные под посев различных культур	1 - 2	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков в конце лета или осенью в послуборочный период. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га.
	2 - 3	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	
	3 - 3,5	Злостные многолетние (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки	
Пары	1 - 2	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га.
	2 - 3	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	
	3 - 3,5	Злостные многолетние (свиной, вьюнок полевой, бодяк полевой и др.) сорняки	
Земли не с/х назначения	1,5 - 3	Однолетние злаковые и двудольные сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста. Расход рабочей жидкости – 100-200 л/га. Запрещается сбор ягод и грибов в период проведения обработки.
	3 - 4	Многолетние злаковые и двудольные сорняки	

Клорит, ВР

300 г/л клопиралида

- Работает против злостных сорняков в посевах с/х культур (виды осота, бодяка, латука, горца, ромашки и др.)
- Уничтожает как надземную, так и подземную часть сорных растений
- Обладает высокой селективностью к защищаемым культурам
- Прекрасный партнёр баковых смесей

Незаменимый гербицид для борьбы с трудноискоренимыми и злостными сорняками в посевах сельскохозяйственных культур



Канистра 5 л



Срок годности 3 года от 0 до +30 °С

Механизм действия

Системный гербицид ауксинового типа. Клопиралид поглощается всеми органами растения, перемещается по нему и накапливается в точках роста, нарушая деление клеток. Сорняки прекращают рост через несколько часов после обработки.

Спектр действия

Виды осота, бодяка, латука, ромашки, горца, гречишка вьюнковая, одуванчик, щавель, подорожник, тысячелистник и другие двудольные сорняки.

Скорость действия

Признаки увядания сорных растений (деформация, скручивание, утолщение стеблей и листьев) наблюдаются на 4-5 день; хлороз, отмирание точки роста и затем гибель сорняков – через 10-15 дней.

Период защитного действия

Действует только на сорняки, находившиеся в посевах в момент проведения обработки. На сорняки, взошедшие после проведения опрыскивания, препарат не действует.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Оптимальная температура для применения препарата находится в пределах от +10 °С до +25 °С. Обработку следует проводить по активно вегетирующим сорнякам: 2-10 листьев у однолетних и 10-15 см («розетка») у многолетних корнеотпрысковых сорняков. В зависимости от видового состава сорняков на сахарной свёкле рекомендуется применять баковые смеси со следующими гербицидами: Вымпел 2, Вымпел 3, Флуорон, Галлон. Не рекомендуется применять препарат за 3 дня до и после заморозков.

Не применять в условиях, когда культура находится в стрессовом состоянии (по причине засухи, при сильном поражении болезнями и повреждении вредителями). Препарат не оказывает влияния на последующие культуры севооборота.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с щелочной или кислой реакцией.

Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница озимая и яровая, ячмень	0,16 - 0,5	Виды ромашки, горца гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе кущения - до выхода в трубку культуры. Озимые культуры обрабатываются весной. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.
Свекла сахарная	0,3 - 0,5		Опрыскивание посевов в фазе 1-3 пары настоящих листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.
Кукуруза	0,5 - 1	Виды ромашки, горца, гречишка вьюнковая, виды бодяка, осота, латука	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.
Рапс яровой (семенные посевы)	0,3 - 0,4	Виды осота, ромашки, горца	Опрыскивание в фазе 3-4 настоящих листьев рапса ярового. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.
Земляника	0,5 - 0,6	Многолетние двудольные (осоты, щавель, одуванчик) и однолетние двудольные (виды ромашки, горца)	Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости - 200-300 л/га.

Применение в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ)

Газоны	1,5 мл/5 л воды (Л)	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание вегетирующих сорняков после первого укоса. Расход рабочей жидкости 5л/100 м ² .
	6,0 мл/5 л воды (Л)	Однолетние и многолетние двудольные сорняки (одуванчик, подорожник, щавель, тысячелистник, ромашка)	
Земляника	3,0 мл/3 л воды (Л)	Многолетние двудольные сорняки (осоты, щавель, одуванчик) и некоторые однолетние двудольные (виды ромашки, горца)	Опрыскивание вегетирующих сорняков после сбора урожая. Расход рабочей жидкости 3 л/50 м ² .

Клетодим Плюс Микс, КЭ*

250 г/л клетодима

Универсальный гербицид для борьбы
с любыми злаковыми сорняками



Канистра 5 л



Срок годности 2 года
от +5 до +30 °С

- Обладает системным действием, проникает во все части сорняков, включая корни и корневища
- Уничтожает практически все виды однолетних и многолетних злаковых сорняков, в том числе злостные (пырей, свинорой, гумай)
- Применяется без ограничения по стадии развития культурных растений

Механизм действия

Проникает в растения через надземные органы и перемещается к корневой системе, поэтому действует на сорняки, встречающиеся в посевах в период обработки препаратом. Гербицид не проникает через почву и не оказывает воздействия на сорняки, появившиеся после опрыскивания.

Спектр действия

Однолетние и многолетние злаковые сорняки, в т. ч. пырей ползучий

Скорость действия

Первые признаки воздействия проявляются через 2-4 дня после опрыскивания. В течение 5-7 дней после обработки рост сорняков прекращается, отмечается побурение в точках роста, хлороз листьев.

Период защитного действия

Препарат действует только на сорняки, находившиеся в посевах в момент обработки.

На сорняки, взошедшие после опрыскивания (вторая «волна») — препарат не действует.

Возможность возникновения резистентности

Возникновение резистентности не выявлено.

Рекомендации по применению

Препарат применяется только совместно с ПА-Вом Альф, Ж, что гарантирует максимальную эффективность даже в сложных погодных условиях и по переросшим сорнякам.

Минимальные дозировки препарата рассчитаны на применение в оптимальные сроки по всходам злаковых сорняков.

Максимальную дозировку следует применять при высокой засоренности посевов и по переросшим сорнякам. При обработке льна не рекомендуется добавлять в рабочий раствор любые ПАВы, а также применять баковые смеси с противодвудольными препаратами.

Совместимость

Отмечен некоторый антагонизм в баковых смесях с бентазоном. Не рекомендуется смешивать препарат с удобрениями.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Свекла сахарная, соя	0,2 - 0,4	Однолетние злаковые сорняки	Опрыскивание сорняков в период их активного роста (в фазе от 2-6 листьев) с добавлением 0,2-0,4 л/га ПАВ Альф, Ж. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Лен-долгунец			Опрыскивание посевов в фазе “елочки” льна, 2-6 листьев у однолетних злаковых сорняков с добавлением 0,2-0,4 л/га ПАВ Альф, Ж. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Лен масличный			Опрыскивание сорняков в фазе 2-6 листьев у сорняков независимо от фазы развития культуры с добавлением 0,2-0,4 л/га ПАВ Альф, Ж. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Подсолнечник			
Рапс яровой и озимый			
Свекла сахарная, соя	0,7 - 1,0	Многолетние злаковые (пырей ползучий) сорняки	Опрыскивание посевов при высоте сорняков 10-20 см с добавлением 0,7-1 л/га ПАВ Альф, Ж. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Лен-долгунец			Опрыскивание посевов в фазе “елочки” льна, при высоте пырея ползучего 10-20 см в баковой смеси с 0,7-1 л/га ПАВ Альф, Ж. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Лен масличный			
Подсолнечник			Опрыскивание посевов при высоте пырея ползучего 10-20 см независимо от фазы развития культуры с добавлением 0,7-1 л/га ПАВ Альф, Ж. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Рапс яровой и озимый			

Ларт, ВР*

480 г/л дикамбы

- Высокая биологическая эффективность против широкого спектра двудольных сорняков
- Подавляет сорняки, устойчивые к 2,4-Д и МЦПА
- Обладает ярко выраженным синергическим эффектом в баковых смесях с препаратами на основе 2,4-Д, МЦПА, сульфонилмочевин, карфентразон-этила и глифосата
- Избирателен по отношению к культуре

Гербицид широкого спектра действия для борьбы с однолетними и некоторыми многолетними двудольными сорняками в посевах зерновых и кукурузы



Канистра 5 л



Срок годности 2 года от 0 до +25 °С

Механизм действия

Дикамба проникает в растения сорняков через надземные органы и частично через корни, быстро распространяясь по всему растению и аккумулируясь в точках роста. Ларт вызывает нарушения гормонального баланса в растении, в результате чего возрастает скорость деления клеток, более интенсивно происходит процесс дыхания, корни утрачивают способность поглощать элементы питания. Всё это приводит к гибели сорняков.

Спектр действия

Амброзия полыннолистная, бодяк полевой, василёк синий, вероника (виды), вика посевная, гречишка вьюнковая, горец почечуйный, горец птичий, горчица полевая, дейскурайния Софьи, дымянка лекарственная, звездчатка средняя, канатник Теофраста, крестовник весенний, лебеда раскидистая, лютик (виды), мак самосейка, незабудка полевая, осот огородный, осот полевой, одуванчик лекарственный, паслён чёрный, пастушья сумка, пикульник (виды),

подмаренник цепкий, портулак огородный, пролесник однолетний, просвирник (виды), пупавка полевая, редька дикая, торица полевая, фиалка полевая, чистец полевой, щирца (виды), ярутка полевая, яснотка стеблеобъемлющая, яснотка пурпурная, дурнишник (виды).

Скорость действия

Гербицидное действие проявляется на 2-5 день в виде хлорозов, угнетения и деформации растений. Полное отмирание сорных растений наступает через 15-30 суток.

Период защитного действия

Действует только на сорняки, находившиеся в посевах в момент проведения обработки. На сорняки, взошедшие после проведения опрыскивания, препарат действует слабо.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Максимальная эффективность достигается при обработке в фазу 2-6 листьев у однолетних двудольных сорняков (высота 5-10 см), многолетних корнеотпрысковых – в фазу розетки – до начала стеблевания. Максимальную норму расхода следует использовать при высокой засорённости, по переросшим сорнякам и при наличии многолетних корнеотпрысковых сорняков. Оптимальная температура для применения препарата: от +12 до +25 °С. Для расширения спектра подавляемых сорняков на зерновых колосовых рекомендуется применять баковые смеси с препаратами на основе 2,4-Д (Эндимион), карфентразон-этила (Буцефал), на кукурузе — с римсульфуоном (Гримс).

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница яровая и озимая	0,15 - 0,3	Однолетние сорняки, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и МЦПА и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота, бодяка и др.	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры, 2-4 листьев у однолетних сорняков и при высоте многолетников 15 см. Применяется как самостоятельно, так и в качестве добавки к 2,4-Д и МЦПА. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Кукуруза	0,4 - 0,8	Однолетние сорняки, в т. ч. устойчивые к 2,4-Д и некоторые многолетние двудольные, включая виды осота, бодяка	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры, 2-4 листьев у однолетних сорняков и при высоте многолетников 15 см. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Метарон, ВДГ

700 г/кг метамитрона

- Не фитотоксичен для растений свёклы при любой схеме применения
- Стандарт в борьбе против переросшей мари
- Проникает в сорное растение как через листья, так и через корни
- Работает в широком диапазоне температур
- Обладает почвенной активностью, создает «экран» для прорастающих сорняков
- Совместное использование с гербицидами на основе десмедифама и фенмедифама

Базовый гербицид для борьбы с переросшей марью в посевах свеклы



Пакет 5 кг



Срок годности 3 года от -15 до +40 °C

Механизм действия

Метамитрон адсорбируется преимущественно корнями, но может проникать в растения и через листовую пластинку. Механизм действия основан на ингибировании транспорта электронов, участвующих в процессе фотосинтеза (фотосистема II) – ингибирование реакции Хилла при фотосинтезе. Это ведёт к блокированию фотосинтеза и гибели сорняков.

Спектр действия

Вероника (виды), галинсога мелкоцветная, горец (виды), горчица полевая, гулявник (виды), дескурайния Софии, дымянка аптечная, звездчатка средняя, капуста полевая, кохия веничная, крестовник обыкновенный, лебеда (виды), марь (виды), пастушья сумка, паслен черный, пикульник (виды), подмаренник цепкий, портулак огородный, ромашка (виды), редька дикая, росичка кроваво-красная, трехреберник, щирица (виды), яснотка пурпурная, ярутка полевая, фиалка полевая.

Период защитного действия

Метарон обеспечивает защиту культуры на срок до 4-х недель в зависимости от погодных условий, типа почвы, степени засорённости и видового состава сорняков.

Скорость действия

Явные признаки угнетения сорняков (хлороз, усыхание) хорошо заметны через 2 – 7 дней после обработки. Полная гибель сорняков наступает через 2 - 3 недели. При довсходовом применении сорняки погибают при прорастании.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Максимальная эффективность достигается, когда однолетние двудольные сорняки находятся в фазе семядолей – двух настоящих листьев.

Оптимальная температура воздуха для проведения обработки – не ниже +5 °C и не выше +25 °C. Не рекомендуется обрабатывать посеы свёклы, ослабленные стрессом по причине заморозков, жары, поврежденные вредителями и болезнями. Не обрабатывать посеы менее чем за 6 часов до выпадения осадков или при сильной росе.

ВНИМАНИЕ! Препарат рекомендуется использовать с пеногасителями.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, кг/га	Вредный объект	Способ применения
Свекла сахарная, кормовая	1,5 -2	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов по всходам сорняков (в фазе семядолей у двудольных видов) с последующей обработкой через 8-14 дней при повторном отрастании сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Тифи, ВДГ

750 г/кг тифенсульфурон-метила

- Контролирует злостные двудольные сорняки
- Высокая начальная гербицидная активность.
- Широкое окно применения на зерновых
- Высокая селективность к обрабатываемой культуре

Послевсходовый гербицид для борьбы с широколиственными сорняками на посевах кукурузы, озимой пшеницы, сои и льна



Банка 100 г



Срок годности 3 года
от -25 до +30 °С

Механизм действия

Проникает через листья и корни. Передвигается к точкам роста, где блокирует фермент ацетолататсинтазу, необходимую для синтеза незаменимых аминокислот (лицина, изолейцина и валина). Гибель растения наступает в результате остановки деления клеток.

Спектр действия

Однолетние двудольные сорняки, в т. ч.: канатник Теофраста, щирица жминдовидная, щирица запрокинутая, марь белая, марь зеленая, вьюнок полевой, дурман обыкновенный, ромашка непахучая, горец земноводный, горец змеиный, горец вьюнковый, горец шероховатый, горец почечуйный, портулак огородный, редька дикая, горчица полевая, паслен черный, звездчатка злачная, звездчатка средняя, ярутка полевая, дурнишник обыкновенный.

Период защитного действия

До появления второй «волны» сорняков.

Скорость действия

Хлороз, отмирание точек роста и некроз проявляются через 2-3 дня после применения. Гибель чувствительных сорных растений может занять 10-20 дней. Находящиеся в период опрыскивания в более поздних фазах развития сорные растения могут остановить свой рост, что существенно ослабляет их конкуренцию с культурой.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Тифи применяется совместно с ПАВ Альф, Ж. Максимальной эффективности гербицида можно добиться при применении по сорнякам в начальные фазы роста. Обработку зерновых культур можно проводить до 2-3 междоузлия. Кукурузу обрабатывают в фазе 3-5 листьев.

На льне Тифи применяется без ПАВ, во избежание фитотоксичности, при этом обработку граминицидами стоит рекомендовать спустя 2-3 недели после обработки Тифи. Сою обрабатывают в фазе 1-2 тройчатого листа, при высокой засоренности и по переросшим сорнякам рекомендуется применение баковой смеси Тифи 0,007 кг/га + Бентасил 1,8 л/га + Алгоритм 0,3 л/га по переросшим сорнякам совместно с 200 мл/га ПАВ Альф, Ж.

Совместимость

Тифенсульфурон-метил совместим с карбаматными инсектицидами, но несовместим с фосфорорганическими инсектицидами.

Культура	Норма расхода, кг/га	Вредный объект	Способ применения
Кукуруза (кроме кукурузы на масло)	0,01	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов в фазе 3-5 листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в баковой смеси с ПАВ Альф, Ж (200 мл/га).
Пшеница озимая	0,015	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к 2,4-Д	Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры в смеси с ПАВ Альф, Ж (200 мл/га).
Пшеница и ячмень яровые	0,01 - 0,015		Опрыскивание посевов весной в фазе кущения культуры.
Пшеница озимая	0,02 - 0,025		
Пшеница и ячмень яровые	0,015 - 0,02		
Соя	0,006 - 0,008	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе 1-2 настоящих листьев культуры и ранние фазы роста сорняков в смеси с ПАВ Альф, Ж (200 мл/га).
Лен-долгунец (только семенные посевы)	0,01 - 0,015	Однолетние двудольные сорняки, в том числе устойчивые к МЦПА	Опрыскивание посевов весной в фазе «елочки» культуры.
Лен-долгунец	0,01 - 0,025		Опрыскивание посевов весной в фазе «елочки» культуры.
Лен масличный	0,025		

Флуорон, ВДГ

500 г/кг трифлусульфурон-метила

- Высокоэффективен в борьбе со многими видами двудольных сорняков
- Не фитотоксичен по отношению к свёкле
- Отсутствует последствие на последующие культуры севооборота
- Обладает быстрым гербицидным действием
- Прекрасно совместим с препаратами на основе десмедифама и фенмедифама

Послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними двудольными сорняками в посевах свеклы



Пакет 600 г



Срок годности 3 года
от -20 до +30 °С

Механизм действия

Системный гербицид, проникающий через листья. Во влажных условиях поглощается корнями. Препарат накапливается в точках роста и останавливает деление клеток сорных растений. Обладает почвенным действием до 3-4 недель.

Спектр действия

Канатник Теофраста, щирица запрокинутая, молочай, виды ромашки, редька дикая, виды горца, подмаренник цепкий, виды вероники, пикульник обыкновенный, льнянка, падалица подсолнечника, пастушья сумка, виды яснотки, паслен черный, горчица полевая, незабудка полевая, ярутка полевая, всходы осота, пролесник однолетний, мак самосейка, фиалка полевая, амброзия полыннолистная, всходы вьюнка, марь белая.

Скорость действия

Остановка роста сорняков происходит через несколько часов после обработки, признаки подавления проявляются через 5-7 дней, полная гибель наступает на 10-15 день.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Максимальную чувствительность к гербициду сорняки проявляют в фазы семядоли – 2 настоящих листа. Проводить обработки можно при появлении 70-90 % всходов культуры и до смыкания рядов. Флуорон применяется только в смеси ПАВ Альф, Ж при норме расхода последнего 200 мл/га.

Расход рабочего раствора – 200-300 л/га.

Не рекомендуется применять Флуорон при температуре ниже +8 °С и выше +25 °С. Не применять препарат, если ночная температура ниже +5 °С, за 3 дня до заморозков и через 3 дня после них. Не применять в условиях, когда культура находится в стрессовом состоянии (по причине засухи, при сильном поражении болезнями и повреждении вредителями).

Совместимость

Совместим со всеми гербицидами, применяемыми на сахарной свекле, а также инсектицидами (кроме фосфорорганических), фунгицидами и микроудобрениями.

Культура	Норма расхода, кг/га	Вредный объект	Способ применения
Свекла сахарная	0,03	Однолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазу сорняков семядоли – 2-х настоящих листьев, и при необходимости повторно через 7-15 дней по второй волне сорняков в фазу 2-х настоящих листьев в смеси с 200 мл/га ПАВ Альф, Ж при каждой обработке.

Фомесофт, ВК

250 г/л фомесафена

- Широкий спектр контролируемых однолетних двудольных сорняков
- Отличный партнер в баковых смесях с бентазоном
- Обладает почвенной активностью
- Гербицидная активность усиливается в солнечную погоду

Контактный селективный гербицид для борьбы с однолетними двудольными сорными растениями в посевах сои



Канистра 5 л, 10 л



Срок годности 2 года от 0 до +35 °С

Механизм действия

Фомесофт - контактный селективный гербицид, слабо перемещающийся по растению. Проникает в растения, главным образом, через листья. Высокая влажность воздуха, повышенная температура (+20...+25 °С) и хорошая освещенность способствуют более быстрому поглощению препарата растениями. Механизм действия фомесафена основан на необратимом блокировании транспорта электронов, участвующих в процессе фотосинтеза. Вследствие этой реакции прерывается ассимиляция CO₂, останавливается рост, и растение погибает.

Спектр действия

Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки, в т. ч.: горчица полевая, виды мари, виды ромашки, дурнишник, гречишка вьюнковая, горцы (виды), щирица (виды), паслен черный, портулак (виды), амброзия (виды), подсолнечник сорно-полевой, конопля, подмаренник цепкий, гулявник струйчатый, молочай (виды), частуха обыкновенная, виды ясноток, пикульник обыкновенный, фиалка полевая.

Скорость действия

Видимые признаки угнетения сорняков в зависимости от погодных условий проявляются через 3-7 дней после обработки гербицидом. Полная гибель сорняков наступает примерно через 2 недели.

Возможность возникновения резистентности

За длительный период использования фомесафена случаев возникновения резистентности не выявлено.

Рекомендации по применению

Наиболее эффективна обработка в ранние фазы роста сорных растений (2-5 листьев). Сою целесообразно обрабатывать с фазы 1-го настоящего листа. От переросшей мари и падалицы подсолнечника рекомендуется применение в сочетании с Бентасилом и ПАВ Альф, Ж. Высев подсолнечника, сахарной свеклы, сорго, кукурузы, люцерны возможен через 18 месяцев после применения препарата.

Препарат усиливает свою гербицидную активность во влажных условиях и в ясную солнечную погоду. Фомесафен сохраняется в почве в течение 1-4 месяцев в зависимости от типа почв и погодных условий. На следующий год безопасно возделывать сою и бобы. Высев подсолнечника, сахарной свеклы, сорго, кукурузы, люцерны возможен через 18 месяцев после применения препарата.

Совместимость

Фомесофт совместим в баковых смесях с препаратами, имеющими нейтральную и щелочную реакцию. Не совместим с препаратами, имеющими кислую реакцию среды. Использование баковых смесей гербицида Фомесофт перспективно, так как расширяет спектр его действия на сорняки.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Соя	1,5 - 2	Однолетние двудольные и некоторые многолетние двудольные сорняки	Опрыскивание посевов, начиная с фазы первого настоящего листа культуры в ранние фазы роста сорняков (2-5 листьев). Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Формуляр, КЭ*

100 г/л феноксапроп-П-этила +
50 г/л клоквинтосет-мексила (антидот)

Универсальный граминицид для защиты
пшеницы и ярового ячменя



Канистра 10 л



Срок годности 2 года
от 0 до +35 °С

НОВИНКА!

- Может применяться на пшенице и на ячмене
- Высокая активность против широкого спектра однолетних злаковых сорняков
- Селективность к обрабатываемой культуре
- Широкий диапазон сроков применения
- Останавливает рост и развитие сорняков в первые сутки после применения

Механизм действия

Граминицид активно поглощается надземными частями растений и перемещается к точкам роста. Механизм действия основан на ингибировании синтеза жирных кислот, что останавливает производство клеточных мембран в меристемных тканях.

Спектр действия

Однолетние злаковые сорняки: овсюг обыкновенный, костер обыкновенный, лисохвост мышехвостниковидный, метлица обыкновенная, метлица просовидная, мятлик обыкновенный, плевел (виды), росичка кроваво-красная, щетинник зеленый, просо (виды).

Скорость действия

Остановка роста и развития сорняков происходит в первые сутки после проведения обработки. Видимые симптомы гербицидного действия проявляются на 10-14 день. Гибель сорняков происходит через 2-3 недели.

Возможность возникновения резистентности

Во избежание возникновения резистентности следует чередовать гербициды из разных химических классов.

Совместимость

Необходимо избегать применения Формуляра в баковых смесях с препаратами на основе 2,4-Д и дикамбы. В случае применения граминицида совместно с препаратами на основе МЦПА норма расхода последнего не должна превышать 400 г д.в./га. Формуляр совместим с большинством гербицидов из класса сульфонилмочевин, а также инсектицидами, применяемыми в те же сроки.

Рекомендации по применению

Благодаря повышенному содержанию клоквинтосет-мексила (антидот) Формуляр может применяться как на озимой и яровой пшенице, так и на яровом ячмене. При обработке Формуляром следует ориентироваться на фазу развития сорняков.

Оптимальными являются фазы 2-3 листьев однолетних злаков. Фаза развития культуры при этом не имеет значения. Наиболее оптимально ждать массовых всходов сорняков для применения Формуляра. В случае массовых всходов злаковых сорняков рекомендуется проводить обработку граминицидом Формуляр отдельно от противодвудольных гербицидов.

Опрыскивание Формуляром рекомендуется проводить в утренние или вечерние часы при температуре воздуха от +8 до +23 °С (ночная температура не должна быть ниже +5 °С) и скорости ветра не более 3 м/с. В пасмурную погоду обработку можно проводить в течение всего дня.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница яровая	0,4 - 0,6	Однолетние злаковые сорняки (виды щетинника, просо куриное)	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га.
	0,6 - 0,9	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, просо куриное)	Опрыскивание посевов по вегетирующим сорнякам, начиная с фазы 2 листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га.
	0,5 - 0,7	Овсюг	Опрыскивание посевов в ранние фазы развития (2-3 листа) сорняков, независимо от фазы развития культуры. Расход рабочей жидкости 150-200 л/га
Пшеница озимая	0,6 - 0,75	Однолетние злаковые сорняки (овсюг, щетинники, метлица, просовидные)	Опрыскивание посевов весной по вегетирующим сорнякам начиная от 2-х листьев до конца кущения (независимо от фазы развития культуры). При использовании максимальной нормы применения гербицида на селекционных и семеноводческих посевах пшеницы учитывать устойчивость сортов. Расход рабочей жидкости — 150-200 л/га.

Эндимион, КЭ

564 г/л 2,4-Д в виде эфира

- Эфиры 2,4-Д быстрее проникают в сорные растения и сильнее поражают чувствительные виды по сравнению с солями
- Активно передвигается по сосудистой системе сорняков от листьев к точкам роста побегов и корневой системе, поэтому обладает эффективностью против многолетних сорняков (осоты, бодяки)
- Эффективен в условиях засухи, не обладает последствием
- Проявляет гербицидную активность при температурах от +5 °С
- Является отличным компонентом баковых смесей

Послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними и некоторыми многолетними двудольными сорняками в посевах зерновых колосовых культур



Канистра 20 л



Срок годности 2 года от -15 до +35 °С

Механизм действия

Гербицид быстро проникает и распространяется по всем частям сорных растений (в т. ч. корни) и блокирует рост клеток в молодых тканях. Аналог регулятора роста.

Спектр подавляемых сорняков

Однолетние и некоторые многолетние двудольные сорняки (бодяки, осоты).

Скорость действия

Первые видимые симптомы поражения наблюдаются через 1-3 дня. Полная гибель сорняков происходит в течение 3-7 дней в зависимости от погодных условий и видового состава сорняков.

Возможность возникновения резистентности

Для предотвращения возникновения устойчивости к препарату необходимо чередовать его с гербицидами из других химических групп.

Рекомендации по применению

Обработку следует проводить в фазу кущения культуры по активно вегетирующим сорнякам: 2-10 листьев у однолетних и фаза «розетки» у многолетних сорняков. Оптимальный температурный диапазон применения +5...+25 °С.

Для расширения спектра действия рекомендуется баковая смесь Эндимион 0,6 л/га + Аргамак 15 г/га. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Вредный объект	Способ применения
Пшеница и ячмень яровые	0,6 - 0,8	Однолетние и некоторые многолетние (бодяк полевой) двудольные сорняки	Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры и ранние фазы роста сорняков. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Пшеница озимая			Опрыскивание посевов в фазе кущения культуры весной. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.

Десиканты

Буцефал, КЭ	138
Молоток, ВР	140



Буцефал, КЭ

480 г/л карфентразон-этила

- Способствует оттоку пластических веществ к семенам и клубням. Ускоряет процесс естественного созревания семян
- Улучшает качество семян масличных культур и способствует снижению кислотного числа
- Увеличивает толщину кожуры клубней картофеля
- Подсушивает зеленую массу сорняков
- Облегчает уборку урожая
- Разрешен для авиаприменения

Высокоэффективный десикант для подсолнечника, картофеля и рапса



Канистра 5 л



Срок годности 2 года от -15 до +35 °С

Механизм действия

Карфентразон-этил является гербицидом контактного действия. Действует посредством ингибирования протопорфириноген оксидазы клеточных ферментов (ингибитор клеточных ферментов), что ведет к остановке фотосинтеза и разрушению клеточных мембран.

Скорость действия

Визуальные признаки действия препарата отмечаются через 5-7 дней после опрыскивания. Полное высыхание зеленой массы происходит через 10-14 дней. Процесс высушивания близок к естественному созреванию растений, что способствует увеличению содержания масла, белка в семенах. Установлено, что качество масла, полученного из семян подсолнечника, обработанного Буцефалом, выше за счет достоверного снижения кислотного числа.

Рекомендации по применению

Обработку препаратом проводят за 15-20 дней до уборки урожая. Буцефал применяют методом наземного или авиационного опрыскивания с нормой расхода рабочего раствора 250 или 50-100 л/га (при авиаприменении).

На рапсе применяется в баковой смеси с клеем Бифактор (0,1 л/га Буцефала + 1 л/га Бифактора). Эта смесь позволяет практически избежать потерь урожая.

При применении авиаметодом рекомендуется использовать эмульгатор Авилор, 90 мл/га для равномерности распределения раствора

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной или кислой реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Культура	Норма расхода, л/га	Способ применения.
Подсолнечник	0,1 – 0,125 (А)	Наземное и авиационное опрыскивание растений в начале естественного созревания при побурении 70-80 % корзинок (при влажности семян 25-30 %). Расход рабочей жидкости для авиационного опрыскивания – 50-100 л/га, для наземного опрыскивания – 250 л/га.
Рапс яровой, озимый		Наземное и авиационное опрыскивание растений при пожелтении 70-75 % стручков (при влажности семян 25-30 %). Расход рабочей жидкости для авиационного опрыскивания – 50-100 л/га, для наземного опрыскивания – 250 л/га.
Картофель		Наземное опрыскивание растений за две недели до уборки урожая. Расход рабочей жидкости – 400 л/га.

Молоток, ВР

150 г/л диквата дибромид

Универсальный десикант



Канистра 20 л,
кубтейнер 1000 л



Срок годности 3 года
от 0 до +35 °С

- Обеспечивает быстрое и равномерное подсушивание растений, что позволяет приступить к уборке уже через 5-7 дней после обработки
- Снижает влажность семян, в результате уменьшаются затраты на сушку
- Сокращает потери семян при уборке
- Способствует повышению качества семян и сохранению масличности
- Облегчает уборку: наряду с культурными высушивает и сорные растения
- Способствует снижению затрат на уборку
- Снижает риск распространения и развития болезней (белая и серая гнили подсолнечника)

Механизм действия

Высушивание растений происходит в результате нарушения физиологических и биохимических процессов, что ведёт к ослаблению водоудерживающей способности тканей, гибели клеток и высушиванию растений.

Скорость действия

Эффект десикации проявляется через 5-7 дней, в зависимости от температуры воздуха и степени созревания растений.

Рекомендации по применению

Обработка препаратом Молоток позволяет эффективно регулировать сроки уборки урожая, повысить качество семян, уменьшить затраты на их доработку и сушку, снизить распространение и развитие болезней. При наземном опрыскивании используется норма расхода рабочей жидкости не менее 200 л/га. Не допускайте стекания рабочего раствора с обработанной поверхности!

Для приготовления рабочего раствора используйте только чистую воду. Для загущенных и сильно облиственных посевов, а также при влажности воздуха менее 60 %, при высокой температуре воздуха более 35 °С, а так же при длительной засухе рекомендуется использовать неионогенный ПАВ – Альф, Ж (этоксилат изодецилового спирта 900 г/л). В солнечную погоду скорость действия препарата увеличивается. Продукт отлично противостоит осадкам, через 15-30 минут после обработки уже не смывается с обработанных растений!

В случае прогнозируемых затяжных осадков не рекомендуется применять десикант. Кроме того, необходимо придерживаться рекомендованных фаз развития культурного растения на момент десикации.

Совместимость

Совместим в баковых смесях с аммиачной селитрой.

При применении авиаметодом рекомендуется использовать эмульгатор Авилор, 90 мл/га для равномерности распределения раствора

Культура	Норма расхода, л/га	Способ применения
Соя	2,0 2,0 (А)	Наземное или авиационное опрыскивание посевов при побурении 50-70 % бобов за 10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости при наземном применении – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га.
Зерновые колосовые культуры (семенные посе́вы)	2,0 2,0 (А)	Наземное или авиационное опрыскивание посевов в период созревания при влажности зерна не выше 30 %. Расход рабочей жидкости при наземном опрыскивании – 200-300 л/га, при авиационной обработке – 50-100 л/га.
Горох (на зерно)	2,0	Опрыскивание посевов в период полной биологической спелости за 7-10 дней до уборки культуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Рапс яровой и озимый (товарные и семенные посе́вы)	2,0	Опрыскивание посевов при побурении семян в стручках среднего яруса. Расход рабочей жидкости – 100-300 л/га
Картофель	2,0	Опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Картофель (сильно облиственные сорта)		2-х кратное опрыскивание в период окончания формирования клубней и огрубления кожуры с интервалом между обработками 3-5 дней. Расход рабочей жидкости – 200-300 л/га.
Подсолнечник	2,0 2,0 (А)	Опрыскивание в начале побурения корзинок. Расход рабочей жидкости 200-300 л/га.

ПАВы и удобрения

Ерёма, Ж.....	144
Агент С, Ж.....	146
Авилор АВИА, КЭ	148
Альф, Ж.....	149
Бифактор, КЭ.....	150
Кондиционер ФМР 20.....	151



Ерёма, Ж

органо-минеральное удобрение

- Повышает урожайность и качество готовой продукции
- Улучшает сохранность полученной продукции
- Повышает устойчивость растений к действию абиотических стрессовых факторов
- Повышает устойчивость растений к болезням

Органо-минеральное удобрение



Канистра 20 л



Срок годности 3 года
от +5 до +35 °С

Механизм действия

Ерёма стимулирует процессы обмена веществ, активирует фотосинтез, улучшает рост и развитие растений, оптимизирует водный обмен (что особенно актуально при засухе). Быстро снимает физиологический стресс культурных растений, вызванный пестицидными обработками. В результате обеспечения растений микроэлементами – кальцием и бором, а также аминокислотами – происходит увеличение урожайности культур, вследствие лучшего опыления цветков и завязываемости плодов.

Рекомендации по применению

Максимальная эффективность действия препарата достигается при опрыскивании растений перед цветением и при формировании семян.

Состав удобрения

Оксид кальция СаО, в т. ч. содержание кальция/л	Бор, г/л	Аминокислоты, г/л	Вода
80 / 57,1	2	50	до 1 л

Наиболее эффективно применение Ерёмы в период бутонизации вместе с инсектицидами (Таран, Клонрин и др.) для борьбы с рапсовым цветоедом и другими вредителями сельскохозяйственных культур.

При подготовке баковой смеси удобрение Ерёма добавляют в бак опрыскивателя в последнюю очередь (после ПАВ). Рабочий раствор должен быть использован в день приготовления. Не рекомендуется проводить некорневые подкормки в жаркую солнечную погоду

Совместимость

Совместим с другими пестицидами, кроме препаратов с сильнощелочной реакцией. Однако в каждом конкретном случае необходима проверка на совместимость.

Регламенты производственного применения

Культура	Доза применения	Способ применения
Зерновые, зернобобовые, технические, масличные, кормовые, овощные, бахчевые, цветочно-декоративные культуры	1-2 л/га Расход рабочего раствора 100-300 л/га	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 15-20 дней
Фруктово-ягодные культуры, виноград, декоративные культуры	1,5-2 л/га Расход рабочего раствора 800-1000 л/га	Некорневая подкормка растений в течение вегетационного периода 2-4 раза с интервалом 15-20 дней
Кормовые, технические, овощные, бахчевые, фруктово-ягодные культуры, виноград, цветочно-декоративные культуры	1-2 л/га (концентрация рабочего раствора – 0,5-1,0 %) Расход рабочего раствора зависит от нормы и системы полива	Корневая подкормка растений (внесение с поливными водами) в течение вегетационного периода.

Регламенты применения в ЛПХ

Культура	Доза применения	Способ применения
Овощные культуры, картофель, цветочно-декоративные культуры	10-20 мл/10 л воды Расход рабочего раствора 1-1,5 л/10 м ²	Некорневая подкормка растений через 7-10 дней после высадки рассады (появления всходов) и далее 1-3 раза с интервалом 15-20 дней
Земляника	10-20 мл/10 л воды Расход рабочего раствора 1-1,5 л/10 м ²	Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 1-3 раза с интервалом 10-15 дней
Фруктово-ягодные, декоративные культуры, виноград	10-20 мл/10 л воды Расход рабочего раствора: кустарники – 1,5-2 л/10 м ² ; деревья - 2-10 л/растение	Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 1-3 раза с интервалом 15-20 дней
Травы газонные	10-20 мл/10л воды Расход рабочего раствора 1-1,5 л/10 м ²	Некорневая подкормка растений весной в начале возобновления вегетации и далее 3-6 раз после скашивания

Агент С, Ж

суперсмачиватель

- Увеличивает эффективность и стабильность рабочих растворов пестицидов
- Усиливает проникновение рабочих растворов в растение
- Повышает эффективность препаратов на растениях, покрытых пылью, восковым налётом и сильно опушённых
- Повышает устойчивость препаратов к смыванию осадками
- Не фитотоксичен

Универсальный органо-силиконовый суперсмачиватель



Канистра 5 л и 20 л



Срок годности 3 года
от 0 до +35 °С

Механизм действия

Агент С применяется в качестве добавки к рабочему раствору пестицидов и агрохимикатов с целью повышения эффективности. Он способствует увеличению площади покрытия поверхности растений рабочим раствором и улучшению смачивания вследствие значительного снижения поверхностного натяжения раствора. Это особенно актуально при использовании низких норм расхода воды, при проведении опрыскивания в условиях засухи или при использовании «жесткой» воды. Используется в баковых смесях с гербицидами, фунгицидами, инсектицидами.

Особенности применения

1. Агент С с фунгицидами.

При попадании рабочего раствора системного фунгицида на верхнюю часть листа, нижняя остаётся не защищённой. Агент С при использовании с системными и контактными фунгицидами обеспечивает наиболее полное покрытие и надёжную защиту всего растения.

2. Агент С с инсектицидами.

В баковой смеси с инсектицидами Агент С значительно усиливает контактную активность и проникновение в труднодоступные места. Это позволяет эффективно бороться со скрытноживущими вредителями, в частности с хлопковой совкой на кукурузе после её проникновения в початок.

3. Агент С с гербицидами.

Повышает эффективность гербицидов на сорняках, листья которых покрыты пылью, восковым налётом и сильно опушены. Усиливает действие гербицидов по переросшим сорнякам.

4. Агент С с почвенными гербицидами.

Обеспечивает проникновение рабочего раствора через мелкие капилляры сухой почвы к влажному слою: создает надёжный гербицидный экран, что позволяет достичь высокой эффективности даже в условиях недостаточной увлажнённости.

ВНИМАНИЕ!

- Агент С не совместим с медьсодержащими пестицидами.
- Максимальные концентрации препарата могут применяться только с системными препаратами и гербицидами сплошного действия.
- Повышенные нормы Агента С или увеличение объёма воды не улучшают покрытия обрабатываемых растений, а наоборот, создают риск чрезмерного стекания рабочего раствора.

Культура / объект / особенности применения		Объём воды на 1 га*	Нормы расхода
Зерновые культуры	Гербициды; инсектициды; болезни листьев и стеблей, болезни колоса	150-250 л	75-100 мл
		100 л	100 мл
Картофель	Высота растений 15-20 см Высота растений 20-65 см Высота растений >65 см	120 л	30-60 мл
		250 л	60-125 мл
		250 л	180-250 мл
Рапс, подсолнечник, сахарная свекла, зернобобовые		150-250 л	100-150 мл
Фруктовые культуры	Полнообъемное опрыскивание Малообъемное опрыскивание	720-840 л	180-420 мл
		200-500 л	50-250 мл
Виноград	Не используется с препаратами на основе меди, или только при концентрации 0,01- 0,02 %, если препараты на основе меди использовались в предыдущих опрыскиваниях	360-560 л	90-280 мл
Овощные культуры		200-300 л	50-150 мл
Почвенные гербициды, гербициды на основе глифосата		200-250 л	50-100 мл
Внекорневые подкормки микроудобрениями		50-150 л	25-75 мл

Авилор АВИА, КЭ

эмульгатор

- Обеспечивает высокую и стабильную эффективность инсектицидов
- Повышает эффективность препарата при опрыскивании растений, покрытых пылью, восковым налётом и сильно опушённых
- Позволяет снизить норму расхода рабочей жидкости до 3 л/га
- Позволяет увеличить скорость обработки
- Повышает устойчивость к смыванию препарата осадками
- Не фитотоксичен

Универсальный эмульгатор для приготовления рабочих растворов пестицидов для применения авиаметодом в сельском и лесном хозяйстве



Канистра 5 л и 20 л



Срок годности 3 года от 0 до +25 °С

Механизм действия

Эмульгатор способствует стабильности водных эмульсий, снижает испаряемость при авиаобработках и обеспечивает равномерное распределение рабочего раствора пестицида на поверхности растений. Повышает эффективность действия инсектицидов. Испытания, проведенные в 2017 г. НПК «ПАНХ», показали высокую эффективность авиационного внесения сверхлегким самолетом типа Х-32 препарата Клонрин с добавлением эмульгатора Авилор Авиа при норме расхода рабочего раствора 3 л/га.

Такой способ применения впервые зарегистрирован для использования в сельском и лесном хозяйстве РФ.

Регламенты применения

Авилор Авиа рекомендуется к применению в норме расхода 90 мл/га или 30 мл/л рабочего раствора при авиаопрыскивании с нормой расхода рабочей жидкости 3 л/га. При подготовке баковой смеси первым растворяют инсектицид, затем добавляют эмульгатор Авилор Авиа.

Альф, Ж

ПАВ (900 г/л этоксилат изодецилового спирта)

- Усиливает проникновение действующего вещества внутрь растения
- Повышает дождестойкость гербицидов
- Позволяет эффективно бороться с сорняками, имеющими опушенную листовую поверхность или покрытых восковым слоем
- Не фитотоксичен



Канистра 5 л



Срок годности 2 года от -10 до +35 °С

Механизм действия

Альф, Ж проявляет поверхностно-активные свойства (является ПАВом). При применении его совместно с гербицидами, он существенно ослабляет поверхностное натяжение рабочего раствора, в результате улучшается распределение капель по поверхности вегетативных органов растения; гербицид дольше сохраняется и быстрее преодолевает восковой налёт на покровных тканях. В результате эффективность препаратов увеличивается на 10-20 %.

Совместимость с другими препаратами

Применяется совместно с гербицидами.

Фитотоксичность

Отсутствует.

Рекомендации по применению

Рабочий раствор готовится механизированным способом непосредственно перед опрыскиванием.

Для приготовления рабочей жидкости заполнить 1/2 бака опрыскивателя чистой водой, добавить маточный раствор препарата и продолжать заполнение бака водой с одновременным перемешиванием. В приготовленный рабочий раствор гербицида вливают заранее отмеренное количество ПАВ – Альф, Ж (из расчета 0,2-0,3 л/га или 0,1 % на одну заправку опрыскивателя).

Бифактор, КЭ

450 г/л синтетического латекса

- Предотвращает потери семян рапса, сурепицы, гороха при созревании и уборке
- Позволяет провести уборку прямым комбайнированием
- Способствует естественному созреванию семян.
- Прекрасно совмещается с десикантами и повышает их эффективность
- Долго сохраняется на поверхности растения, предотвращая растрескивание стручков
- Может применяться в любое время суток



Канистра 5 л



Срок годности 3 года
от 0 до +25 °С

Оптимальные результаты достигаются при применении с десикантом Бифактор 1 л/га + Буцефал 0,1 л/га — за 3 недели до уборки.
Горох — за 2 недели до уборки.

Механизм действия

При попадании рабочего раствора препарата на обрабатываемые растения, сразу после высыхания Бифактор создаёт на их поверхности полимерную латексную пленку. Пленка позволяет испаряться воде с поверхности растения, но не пропускает воду обратно.

Рекомендации по применению

Бифактор следует применять в следующие сроки. **Рапс** — за 3 недели до уборки, стручки ещё зелёные. Стручок можно согнуть в виде буквы V без растрескивания. Цвет семян коричневый или частично жёлтый в стручках верхней части растения.

Культура	Норма расхода, л/га	Способ применения
Рапс, сурепица, горох	0,8 - 1,0	За 2-4 недели до уборки урожая. Норма расхода рабочего раствора 100-300 л/га.

Клей на основе синтетического латекса для предотвращения растрескивания стручков рапса и бобов гороха

Кондиционер ФМР 20

- Смягчает жесткость воды
- Нормализует уровень pH
- Повышает стабильность рабочего раствора
- Усиливает смачиваемость листовой поверхности
- Улучшает прилипаемость и проникаемость пестицидов в растение
- Повышает дождестойкость препаратов



Канистра 20 л



Срок годности 3 года
от +5 до +30 °С

Механизм действия

Жесткая вода может повлиять на эффективность пестицидов из-за образования нерастворимых комплексов. Входящие в состав воды ионы (Ca, Mg, Fe и др.) вступают в реакцию с действующим веществом пестицида и блокируют его проникновение. Кондиционер ФМР 20 нейтрализует входящие в состав воды ионы и нормализует уровень pH воды. ФМР 20 уменьшает скатывание капель рабочей жидкости с поверхности растений, увеличивает площадь покрытия капли и тем самым оптимизирует распределение препарата,

способствуя быстрому проникновению действующих веществ в растение. Кондиционер ФМР 20 улучшает смачивающуюся способность рабочего раствора за счет снижения поверхностного натяжения, что позволяет сократить расход рабочего раствора на 1 га и повысить производительность.

Норма расхода, л/га	Время, особенности применения
0,2	Вносить первым в бак опрыскивателя при приготовлении рабочего раствора

ВНИМАНИЕ!

В заполненный водой на 1/2 бак опрыскивателя сначала вносят Кондиционер ФМР 20, затем добавляют пестициды.

Спектр действия гербицидов

Основные виды сорных растений	Гербициды																		
	2,4-Д аминная соль	2,4-Д эфир	2,4-Д + карфентразон-этил	Трибенурон-метил	Дикамба	Клопиралид	Феноксапроп-П-этил	Галоксифоп-Р-метил	Клетодим	Фенмедифам + десмедифам	Фенмедифам + десмедифам + этофумезат	Оксифлуорфен	Римсульфурон	Трифлусульфурон-метил	Метамитрон	Кломазон	Глифосат	Ацифлуорфен	Фомесафен
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
амброзия	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
полыннолистная	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
бодяк полевой	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
василек синий	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
вероника (виды)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
вика сорнополевая	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
вьюнок полевой	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
горец (виды)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
горчица полевая	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
гречишка вьюнковая	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
дескурация Софьи	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
дурнишник обыкновенный	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
дымянка лекарственная	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

Сорные растения	Гербициды																		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
ежовник [виды]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
звездчатка средняя	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
канатник Теофраста	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
крестовник весенний	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
лебеда раскидистая	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
лисохвост	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
мак самосейка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
марь [виды]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
метлица обыкновенная (полевая)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
молочай (виды)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
мятлик обыкновенный	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
незабудка полевая	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
овсюг	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
одуванчик (виды)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
осот (виды)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
паслен черный	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
пастушья сумка	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
пикульник (виды)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
плевел (виды)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

подмаренник цепкий	blue	blue	red	yellow	red	blue	green	green	green	blue	blue	yellow	yellow	yellow	red	blue	red	yellow	yellow
полынь обыкновенная	blue	yellow	red	yellow	yellow	green	green	green	yellow	yellow	yellow	green	red	white	white	red	yellow	yellow	yellow
портулак огородный	white	white	white	red	white	yellow	green	green	green	red	red	red	blue	white	red	red	red	red	red
пупавка полевая	blue	yellow	red	red	blue	red	green	green	green	blue	blue	red	white	red	green	yellow	white	red	red
пырей ползучий	green	green	green	green	green	white	red	red	green	blue	green	red	green	green	yellow	red	green	green	green
редька дикая	red	red	red	red	red	yellow	green	green	green	red	red	red	yellow	red	red	green	green	red	red
ромашка (виды)	blue	blue	red	red	blue	red	green	green	green	blue	blue	red	yellow	red	red	yellow	red	red	red
свиной пальчатый	green	green	green	yellow	green	white	red	red	green	blue	yellow	red	green	yellow	white	white	yellow	yellow	yellow
смолевка обыкновенная	blue	blue	red	red	red	yellow	green	green	green	red	red	red	yellow	yellow	green	yellow	green	red	red
сорго (виды)	green	green	green	blue	green	green	white	white	white	red	green	blue	blue	yellow	green	green	yellow	red	blue
торица полевая	white	white	white	red	yellow	red	white	green	green	green	red	red	yellow	white	white	yellow	red	red	yellow
фиалка полевая	blue	blue	red	red	yellow	white	green	green	green	yellow	yellow	red	yellow	yellow	red	green	green	red	red
щетинник (мышей) сизый	white	green	green	blue	white	green	red	red	red	green	yellow	blue	red	green	green	red	red	blue	blue
щирца запрокинутая	yellow	yellow	red	red	red	red	green	green	green	red	red	red	yellow	red	red	yellow	red	red	red
ярутка полевая	yellow	red	red	red	red	red	green	green	green	red	red	red	yellow	red	red	yellow	red	red	red
яснотки	yellow	yellow	red	red	red	red	green	green	green	red	red	red	yellow	red	red	yellow	red	red	red

чувствительные сорняки
умеренно чувствительные сорняки
слабо чувствительные сорняки



нечувствительные сорняки
нет данных



больше информации
о средствах защиты
растений — на сайте

fmrus.ru



сайт доступен в мобильной
и полноэкранный версиях

Условия хранения и фасовка

Название	Класс опасности	Темп. режимы хранения, °С	Тип упаковки	Объем упаковки
----------	-----------------	---------------------------	--------------	----------------

Инсектицидные протравители

Вулкан, ТПС	9,1	от -5 до +40	канистра	1 л, 5 л
Имидалит, ТПС	6,1	от -5 до +35	канистра	5 л
Тиамакс, КС	6,1	от -5 до +35	канистра	5 л

Фунгицидные протравители

ТИР, ТПС	9,1	от 0 до +30	канистра	10 л
ТМТД, ТПС	6,1	от -15 до +30	канистра	10 л
Стингер, КС	9,1	от -10 до +40	канистра	5 л
Экселент, КС	9,1	от -10 до +40	канистра	5 л

Фунгициды

Альпари, КЭ	6,1	от -15 до +35	канистра	5 л
Профикс, КЭ	6,1	от -15 до +35	канистра	5 л
Тебумет, КЭ	6,1	от -15 до +35	канистра	5 л
ТриЗаРа Супер, КЭ	6,1	от -15 до +35	канистра	5 л
Экселент, КС	9,1	от -10 до +40	канистра	5 л
Фолиант, КЭ	6,1	от -15 до +35	канистра	5 л

Инсектициды

Айвенго, КЭ	6,1	от -15 до +25	канистра	5 л
Клипер, КЭ	6,1	от -5 до +40	канистра	1 л, 5 л
Клонрин, КЭ	6,1	от -15 до +35	канистра	5 л
Метомакс, КС	6,1	от 0 до +30	канистра	5 л
Таран, ВЭ	6,1	от 0 до +35	канистра	5 л
Тиамакс, КС	6,1	от -5 до +35	канистра	5 л
Циперус, КЭ	6,1	от - до +35	канистра	1 л, 5 л

Название	Класс опасности	Темп. режимы хранения, °С	Тип упаковки	Объем упаковки
----------	-----------------	---------------------------	--------------	----------------

Фумигант

Прокроп, КЭ	9,1	от -15 до +30	канистра	1 л, 5 л
-------------	-----	---------------	----------	----------

Гербициды

Аврора, МД	6,1	от -20 до +35	канистра	10 л
Аврорекс, КЭ	6,1	от -20 до +40	канистра	1 л, 5 л
Акцифор, КЭ	9,1	от 0 до +35	канистра	1 л, 5 л
Алгоритм, КЭ	9,1	от 0 до +30	канистра кубитейнер	1 л, 5 л 1000 л
Антарес, ВК	9,1	от -5 до +35	канистра	10 л
Аргамак, ВДГ	9,1	от -20 до +30	пакет банка	0,1 кг 0,5 кг, 1 кг
Астэрикс, СЭ	6,1	от -15 до +35	канистра	5 л
Ацифект, ВК	6,1	от -5 до +35	канистра	5 л, 10 л
Бентасил, ВР	9,1	от -5 до +40	канистра кубитейнер	20 л 1000 л
Буцефал, КЭ	9,1	от -15 до +35	канистра	5 л
Вымпел 2, КЭ	9,1	от -15 до +35	канистра	5 л
Вымпел 3, КЭ	9,1	от -15 до +35	канистра	5 л
Галлон, КЭ	9,1	от -15 до +35	канистра	5 л
Гримс, ВДГ	9,1	от -20 до +30	банка	0,1 кг
Диамисоль, ВР	6,1	от 0 до +35	канистра	5 л, 20 л
Дикамерон, ВР	9,1	от 0 до +30	канистра	5 л
Дифилайн, КЭ	9,1	от -15 до +35	канистра кубитейнер	5 л, 20 л 1000 л
Зонатор, ВР	9,1	от -5 до +30	канистра	5 л

Название	Класс опасности	Темп. режимы хранения, °С	Тип упаковки	Объем упаковки
Кайман, ВР	9,1	от -15 до +40	канистра кубтейнеры	20 л 1000 л, 20000 л
Кайман Форте, ВДГ	9,1	от -15 до +40	пакет мягкие контейнеры	1 кг, 5 кг, 10 кг 500 кг, 1000 кг
Клорит, ВР	9,1	от 0 до +30	канистра	5 л
Клетодим Плюс Микс, КЭ	9,1	от +5 до +30	канистра	5 л
Ларт, ВР	9,1	от 0 до +25	канистра	5 л
Метарон, ВДГ	9,1	от -15 до +40	пакет	5 кг
Тифи, ВДГ	9,1	от -25 до +30	банка	0,1 кг
Флуорон, ВДГ	9,1	от -20 до +30	пакет	0,6 кг
Фомесофт, ВК	9,1	от 0 до +35	канистра	5 л, 20 л
Формуляр, КЭ	6,1	от -15 до +35	канистра	5 л
Эндимион, КЭ	6,1	от -15 до +35	канистра	20 л

Десиканты

Буцефал, КЭ	9,1	от -15 до +35	канистра	5 л
Молоток, ВР	6,1	от 0 до +35	канистра кубтейнер	20 л 1000 л

Специальные продукты

Авилор АВИА, КЭ	0	от 0 до +25	канистра	5 л, 20 л
Бифактор, КЭ	0	от 0 до +25	канистра	5 л
Агент С, Ж	0	от 0 до +35	канистра	5 л
Ерёма, Ж	0	от +5 до +30	канистра	20 л
Кондиционер ФМР 20	0	от +5 до +30	канистра	20 л
Альф, Ж, ПАВ	0	от -10 до +35	канистра	5 л